

## Flytande betning mot silverskorv

Under 2003 odlades tre sorter för uppförökning på Götala. Strax efter inlagring behandlades partierna enligt följande: Obehandlad, bara tvättad, tvättad+betad och bara betad på jordig potatis. Betningsmedlet som användes 2003 var Fungazil i dos om 2 dl blandat i vatten till en liter per ton. De olika leden graderades under våren på SLU för att undersöka vilken effekt behandlingarna haft. Förenklat kan man säga att det var halva mängden silverskorv i enbart tvättat led jämfört med obehandlat medan det betade oavsett tvättning var dubbelt så bra som bara tvättat, alltså i princip fritt från silverskorv. Under 2004 har dessa behandlade led satts igen för att se om betningen har effekt året

efter vilket i så fall skulle ge svar på om det räcker att beta utsädesuppförökningen för att minska silverskorvsproblemen i matpotatispartierna året efter. Svaret på detta kommer vid provtagningar under våren 2005.

Under 2004 upprepades uppförökningen och under den gångna hösten har samma behandling utförts igen plus att Binab använts för att utreda om det kan ha samma effekt som Fungazil, vilket skulle innebära att det vore möjligt att beta ett matpotatisparti.

Vad som var extra intressant under första året var att enbart tvättning hade god effekt mot silverskorv vilket skulle betyda att man ska tvätta potatisen vid inlagring på hösten!