



FÄLT KORT

2003 L5-306

E-145-2002

05A546

Fältforskningsenheten, ogräsreglering

Försöksserie: Örtogräs i höstvet, höst och vår

Försöksvärd: Hushållningssektorn Klostergården 590 76 VästarkösterGröda: Försök 9^a Gylling

Jordbruksomr: _____

- A. Obehandlat
B. 1.2 l Duplosan Meko 1)
C. 0.75 l Cougar 1)
D. 0.75 l Bacara 1)
E. 0.15 l Lotus + 1.0 l Duplosan Meko 1)
F. 0.5 l Starane 180 + 0.3 l Cougar 1)
G. 0.3 l Cougar 1) + [Behovsanpassning av preparat och dos på våren]
H. 0.25 l Lotus + 2.0 l Duplosan Super 2)
I. 70 g Tooler + 0.1 l DP Vätmedel 2)
J. 125 g Tarok + 1.0 l Citowett 2000 2)
K. 0.1 l Primus + 0.1 l Lissapol Bio 2)
L. 0.1 l Primus + 40 g Plattform 2)
M. 50 g Ally Class 3)
N. 25 g Ally Class 3)
O. 2.0 tabl (10 g) Express + 40 g Plattform 3)
P. 35 g Ally Class + 0.35 l Starane 180 3)
Q. 0.5 l Starane 180 + 0.5 l Cougar 3)
R. 1.5 tabl (7.5 g) Express + 0.6 l Starane 180 + 0.1 l Lissapol Bio 3)
S. 0.5 l Cougar + 15 g Gratil + 0.1 l Lissapol Bio 3)
T. 1.5 tabl (7.5 g) Express + 15 g Gratil + 0.1 l Lissapol Bio 3)

VÄTSKEMÄNGD 200 L/HA LÄS PM
ARBETSTRYCK 0.2 MPA (2 KP/KVCM)
SPALTSPRIDARE, DUSCHKVALITET MEDIUM
BEH VID LUGN VÄDERLEK OCH TORRA BLAD

- 1) Då grödan har 2-3 blad på hösten
2) Mycket tidig vårbehandling
3) Vid tillväxtens början på våren


BRUTTORUTA: 3 M X 13 M ELLER
4 M X 10 M

ÖNSKVÄRDA OGRÄS: SNÄRMÅRA, VIOL, VERONIKA

Rutfördelning i fält

I II III IV
xTFPMOCNLIKESRBQADGHJ NRIDKBAGEQHMTJPCLFOS SMCOALFBGJPEQDNIHKRT FNOMTDJIORALKPHBGCSEX

Karta över försöksfältet



Försöket ligger ca m i riktning från

Norripil o Plöjrikt. o

Allmänna uppgifter/anvisningar:

BRUTTOYTA: 3.0 x 12.0 = 36.0 M2

SKORDEYTA: X = M2

FÖRFRUKT GRÖDA SORT
H-vete H-vete Bisk d

UTSÄDESMÄNGD SÄDATUM

ORG. GÖDS: MEDEL KG/HA DATUM

HANDELSGÖDS: MEDEL KG/HA DATUM

NÄRMASTE VÄDERSTN (SMHI):

Malmstätt

BEH ENL PLAN (DATUM):

1) 30/10 2) 1/11 3) 1/11

ÖVRIGA BEH (KEM, MEK):

Graderingar och bestämningar enl PM:

BEH. SKADOR % AV BESTÅND MÅN-DAG RUTVIS

A) MISSFÄRGNINGAR

B) NEKROSER

C) PLANTDEFORMATIONER

D) TILLVÄXTHÄMNINGAR

STRÅSTYRKA VID SKÖRD MÅN-DAG RUTVIS

OGRÄSBESTÅND VID SKÖRD MÅN-DAG RUTVIS

RÅSKÖRD, KG/RUTA MÅN-DAG RUTVIS

OGRÄSRÄKNING ENL PM RUTVIS

BEH. SKADOR 30/10 2) 1/11 3) 1/11
FYLL I SPRUTJOURNAL NOGGRANNT

Utförarens ansvarig:

Namn och telefon:

Kontaktperson vid SLU:

Tommy Arvidsson 018-671404

S-A Rydell 0708-292834

Datum

Signering

P.M.

Bekämpning av örtogräs i höstvet, höst och vår

1. **Syfte med försöket.** Att visa de provade preparatens verkan mot örtogräs i höstvet.
2. **Preparaten.** Anskaffas och utvägs av Provcentralen.
3. **Försöksplats.** Välj en plats med jämn och riklig förekomst av örtogräs, helst fri från kvickrot. Försöket skall skyltas, ha hörnpålar och gränsas! Bra karta för snabb lokalisering på fältkortet.
Bruttoruta = 3 m x 13 eller 4 m x 10 m.
4. **Jordprov.** Uttas och insänds med tydliga beteckningar till Provcentralen, 750 07 Uppsala.
Endast jordartsbetämning.
5. **Markfuktighet vid behandling.** Ange markfuktigheten i skiktet 1-6 cm som våt, fuktig eller torr.
6. **Gradering.** a) Behandlingsskador på grödan graderas en till två veckor efter respektive behandling. Ange skadornas art samt andel skadat bestånd i respektive parcell i % av obehandlat led.
b) Stråstyrka graderas vid skörd.
c) Ogräsens täckningsgrad graderas vid skörd.
7. **Verkan på ogräset.** Bestäms genom en räkning och vägning av överlevande ogräsplanter enligt nedan ca 5 veckor efter vårbehandling eller då full effekt kan anses ha erhållits. Svårt skadade planter utan möjlighet att överleva räknas inte.
8. **Ogräsräkning.** Samtliga ogräsarter skall räknas i 4 (eller 2) provrutor om minst 0,25 m² per försöksruta. Ange provrutornas storlek. Provrutorna placeras så, att de så väl som möjligt representerar det genomsnittliga ogräsbeståndet i försöksrutan. Antalet ogräsplanter sammanslås för de 4 provrutorna. Arter där plantantalet är färre än 20 på den sammanlagda räknade ytan i det obehandlade ledet men vikten är 50 g eller högre redovisas separat. Arter med mindre än 20 planter och vikt lägre än 50 g på den sammanlagda räknade ytan i det obehandlade ledet sammanförs till någon av följande grupper: "övriga ettåriga örtogräs" eller "övriga fleråriga örtogräs" (t. ex hästhov, knölsyska, åkertistel). I det fall plantantalet är färre än 20 planter skadegräs redovisas separat liksom fräken. Kvickrot och andra skadegräs skall endast vägas, inte räknas.
Obs! Blanda aldrig in fleråriga örtogräs i gruppen ettåriga örtogräs. Skilj alltid mellan örtogräs och skadegräs!
9. **Ogräsvägning.** Varje art vägs samtidigt med ogräsräkningen och vikten anges i gram. Före vägning befrias plantorna från rötter. Det ifyllda protokollet insänds snarast möjligt. Ange ev felbehandling också på ogräsprotokollet.
10. **Skörd.** Rutor på minst 18 m² skördas. Vid tröskningen vägs kärnsköörden. Kärnprov om exakt 1000 g från varje försöksled (4 sammanslagna delprov) insänds med tydliga beteckningar till Provcentralen, 750 07 UPPSALA. Ställ alltid in tröskan på den utanför försöket liggande skyddszonen! Ange skörderutans storlek!
12. **Utvecklingsstadier och fältanteckningar.** Använd "Utvecklingsskalor och EPPO-

koder", 1996 (Leuchovius och Stureson). För fullständiga fältanteckningar under hela försökstiden.