



FÄLTKORT 2005 L5- 241 N-546-2004 05A710
Fältforskningsenheten, ogräsreglering
Försöksserie: Åkerväx och örtgräs i höstvet, höst och vår
Försöksvärd: Magnus Melin
Styrda: Gullbrandstorp
Gröda: Höstvet Jordbruksomr:7


A. Obehandlat	1) Då grödan har 1.5 blad på hösten
B. 1.5 l Cougar 1)	2) Då grödan har 2-3 blad på hösten
C. 1.0 l Bacara 1)	3) Då grödan är i god tillväxt på våren, ej frostrisk
D. 1.25 l Bacara 1)	
E. 15 g Lexus + 0.3 l Bacara 1)	
F. 15 g Lexus + 0.5 l Bacara 1)	
G. 20 g Lexus + 10 g DPX 1010 1)	
H. 0.5 l Bacara 1) + 12.5 g Monitor + 0.2 l Lissapol Bio 3) (M)	
I. 0.5 l Bacara 1) + 18.75 g Monitor + 0.2 l Lissapol Bio 3)	
J. 0.3 l Bacara + 150 g Atlantis + 0.1 l Lissapol Bio 2)	
K. 0.3 l Bacara + 250 g Atlantis + 0.1 l Lissapol Bio 2)	
L. 0.5 l Bacara 2) + 100 g Hussar + 0.5 l Renol 3)	
M. 0.5 l Bacara 2) + 150 g Hussar + 0.5 l Renol 3)	
N. 18.75 g Monitor + 1.0 tabl (5.0 g) Express + 0.2 l Lissapol Bio 3)	
O. 200 g Hussar + 0.5 l Renol 3)	
P. 0.3 l Bacara + 300 g Atlantis + 0.1 l Lissapol Bio 3)	

JÄMN GRÖDA PÅ VATTENHÅLLANDE JORD MED RIKLIG
OCH JÄMN FÖREKOMST AV ÅKERVÄX OCH MED EN
VARIERAD OCH RIKLIG ÖRTGRÄSFLORA. KVICKROT
ELLER ANDRA ROTGRÄS FÅR EJ FÖREKOMMA.

VÄTSKEMÄNGD 200 L/HA LÄS PM
ARBETSTRYCK 0.2 MPA (2 KP/KVCM)
SPALTSPRIDARE, DUSCHKVALITET MEDIUM
BEH VID LUGN VÄDERLEK OCH TORRA BLAD

BRUTTORUTA: 3 M X 13 M ELLER 4 M X 10 M

Rutfördelning i fält I II III IV
XLNMDKFHIAPECJBOG KEGBAIPNOCDLHFJM IEPGHBDCAFJMLKNO CLFJIOPEHKGDBMANX



Försöket ligger ca 100 m i N riktning från Styrdals Gård

Norrpil Plöjn.riktn.

Koordinater för kartvisning: N: 6290120 km ; Ö: 1320580 km.

Allmänna uppgifter/anvisningar:

BRUTTOYTA: 4 X 12 = 48 M2
SKÖRDEYTA: X = M2
FÖRFRUKT GRÖDA SORT
Höstraps Banjo

UTSÄDESMÄNGD SÅDATUM
220 Kg/ha Harnesk 20041002

ORG. GÖDS: MEDEL KG/HA DATUM

HANDELSGÖDS: MEDEL KG/HA DATUM

NÄRMASTE VÄDERSTN (SMHI):
Halmstad

BEH ENL PLAN (DATUM):
20041027, 20041108, 20050503

ÖVRIGA BEH (KEM, MEK):

Graderingar och bestämningar enl PM:

BEH.SKADOR % AV BESTÅND MÅN-DAG RUTVIS
20041122 EB

A) MISSFÄRGNINGAR

0

B) NEKROSER

0

C) PLANTDEFORMATIONER

0

D) TILLVÄXTHÄMNINGAR

0

STRÅSTYRKA VID SKÖRD MÅN-DAG RUTVIS

OGRÄSBESTÅND VID SKÖRD MÅN-DAG RUTVIS

RÅSKÖRD, KG/RUTA MÅN-DAG RUTVIS

OGRÄSRÄKNING ENL PM MÅN-DAG RUTVIS

FYLL I SPRUTJOURNAL NOGGRANNT

Utförarens ansvarig: Namn och telefon: Elisabeth Berndtsson 035-46525 0706-811881
Kontaktperson: Klas Eriksson 0480-15672, 29454, 0708-965921

Datum

Signering

P.M.

Åkerven och örtogräs i höstvet, höst och vår

1. **Syfte med försöket.** Att visa de provade preparatens verkan mot åkerven och örtogräs.
2. **Preparaten.** Anskaffas och utvägs av Provcentralen.
3. **Försöksplats.** Välj en plats med jämn och riklig förekomst av åkerven och örtogräs, **obs ! fri från kvickrot.** Försöket skall skyltas, ha hörnpålar och gränsas. Bra karta för snabb lokalisering på fältkortet. Bruttoreta 3 m x 13 m eller 4 m x 10 m (4 m x 12 m i H län).
4. **Jordprov.** Uttas och insänds med tydliga beteckningar HS-Miljölabb, Flottiljvägen 18, 392 41 Kalmar. Jordartsbetämning, Ph och Al-analys.
5. **Markfuktighet vid behandling.** Ange markfuktigheten i skiktet 1-6 cm som våt, fuktig eller torr.
6. **Sprutjournal.** Fyll i den bifogade sprutjournalen så noggrant som möjligt.
7. **Gradering**
 - a) Behandlingsskador på grödan bestäms genom gradering en till två veckor efter respektive behandling. Ange skadornas art samt andel skadat bestånd i respektive parcell i % av obehandlat led.
 - b) Stråstyrka graderas vid skörd.
 - c) Ogräsens täckningsgrad graderas vid skörd.
8. **Verkan på åkerven och örtogräs.** Bestäms genom en räkning och vägning av ogräsplantorna enl nedan då man klart kan identifiera åkervensplantorna (i vippstadiet). Svårt skadade plantor utan möjlighet att överleva räknas inte.
9. **Ogräsräkning.** Samtliga ogräsarter skall räknas i 4 (eller 2) provrutor om minst 0,25 m² per försöksruta. Ange provrutornas storlek. Provrutorna placeras så, att de så väl som möjligt representerar det genomsnittliga ogräsbeståndet i försöksrutan. Antalet ogräsplantor sammanslås för de 4 provrutorna. Arter där plantantalet är färre än 20 på den sammanlagda räknade ytan i det obehandlade ledet men vikten är 50 g eller högre redovisas separat. Arter med mindre än 20 plantor och vikt lägre än 50 g på den sammanlagda räknade ytan i det obehandlade ledet sammanförs till någon av följande grupper: "övriga ettåriga örtogräs" eller "övriga fleråriga örtogräs" (t. ex hästhov, knölsyska, åkertistel). Skadegräs redovisas separat liksom fräken. Kvickrot skall endast vägas, inte räknas.
Obs! Blanda aldrig in fleråriga örtogräs i gruppen ettåriga örtogräs. Skilj alltid mellan örtogräs och skadegräs!
10. **Ogräsvägning.** Varje art vägs samtidigt med ogräsräkningen och vikten anges i gram. Före vägning befrias plantorna från underjordiska plantdelar. Det ifyllda protokollet insänds snarast möjligt. Ange ev. felbehandling också på ogräsprotokollet.
11. **Skörd.** Rutor på minst 18 m² skördas. Vid tröskningen vägs kärnskorde. Kärnprov om exakt 1000 g från varje försöksled (4 sammanslagna delprov) insänds med tydliga beteckningar till HS-Miljölabb, Flottiljvägen 18, 392 41 Kalmar. Ställ alltid in tröskan på den utanför försöket liggande skyddszonen! Ange skörderutans storlek!
12. **Utvecklingsstadier och fältanteckningar.** Använd "Utvecklingsskalor och EPPO koder", 1996 (Leuchovius och Stureson). För fullständiga fältanteckningar under hela försökstiden.