



FÄLTKORT

2005 L5-110

E-090-2004

05A735

Inst för ekologi och växtproduktionslära, avd för ogräsbiologi

Försöksserie: Åkertistel i vårsäd, efterverkan

Försöksvärd: Familjen Bergman

Ulvåsa Lantbruk, Motala

Gröda:

Jordbruksomr: 12b

A. Obehandlat

B. 2.5 l MCPA 2)

C. 2.5 l Ariane S 2)

D. 1.75 l Ariane S + 0.5 l MCPA 2)

E. 2 tabl Express 50 T + 0.1 l Lissapol Bio 2)

F. 3 tabl Express 50 T + 0.1 l Lissapol Bio 2)

G. 2 tabl Express 50 T + 0.1 l Lissapol Bio + 1.5 l MCPA 2)

H. (2 tabl Express 50 T + 0.1 l Lissapol Bio) 1) + 2.5 l MCPA 3)

FÖRSÖKET FASTLAGT FÖR EFTERVERKAN 2005

Behandling utförd 2004

1) Då grödan har 3-4 blad

INGEN FÖRSÖKSMÄSSIG SKÖRD 2005

2) Då åkertisteln är 10-20 cm

3) Då åkertisteln är 20 cm


LÄS PM

Rutfördelning i fält

Block III-IV: XBAFDGCHE ACGHBDEFX

Block I-II : XDHAECGBF CEDGHAFBX

Karta över försöksfältet



Försöket ligger ca m i riktning från

Norrpil o Plöjn.riktn. o

Koordinater för kartvisning: N: km ; ö: km.

Allmänna uppgifter/anvisningar:

BRUTTOYTA: 3.0 x 12.0 = 36.0 M2

SKÖRDEYTA: X = M2

FÖRFRUKT Korn GRÖDA Träda SORT

UTSÄDESMÄNGD

SÅDATUM

ORG. GÖDS: MEDEL KG/HA DATUM

HANDELSGÖDS: MEDEL KG/HA DATUM

NÄRMASTE VÄDERSTN (SMHI):

ÖVRIGA BEH (KEM, MEK):

Graderingar och bestämningar enl PM:

ÅKERTISTEL, VÅR [CIRAR.SS] MÅN-DAG RUTVIS

ÅKERTISTELRÄKNING ENL PM MÅN-DAG RUTVIS

Utförarensvarig:

Namn och telefon:

Kontaktperson vid ÖSF: Lennart Johansson 013-355304, 0708-290831

P.M.

Bekämpning av åkertistel i vårsäd, efterverkan

1. **Huvudsyfte med försöket.** Att undersöka vilka kemiska behandlingar som har störst effekt mot åkertistel.
2. **Försöksplats.** Försöket skall skyltas, ha hörnpålar och gränsas. Bra karta för snabb lokalisering på fältkortet. Försöket fastlagt.
3. **Gradering samt räkning och vägning av åkertistel.** Skall utföras enligt GEP på våren när huvuddelen av tisteln är uppe.
4. **Gradering.** Skall utföras med avseende på massa och täckningsgrad.
5. **Åkertistelräkning.** Åkertistel skall räknas i 4 (eller 2) provrutor om minst 0,25 m² per försöksruta enligt GEP. Ange provrutornas storlek och antal. Provrutorna placeras så att de så väl som möjligt representerar det genomsnittliga beståndet i försöksrutan. Antalet skott av åkertistel skall sammanställas var för sig för de skilda provrutorna i varje försöksruta.
6. **Åkertistelvägning.** Skotten vägs samtidigt med räkningen och vikten anges i gram. Före vägning befrias skott från underjordiska plantdelar. Det ifyllda protokollet insänds snarast möjligt.
7. **Skörd.** Ingen försöksmässig skörd 2005.

Obs!

- a) Vid bestämning av grödans utvecklingsstadium används "Utvecklingsskalor och EPPO-koder 1996" (Leuchovius och Stureson).
- b) För fullständiga fältanteckningar under hela försökstiden.