



FÄLT KORT

2006 L5-240

D- 1/2 -2005

05A767

Fältforsk, ogräsreglering

Försöksserie: Åkerven och örtogräs i höstveten, höst och vår

Försöksvärd: Fjellskär, Stigum

Gröda: Höstveten

Jordbruksomr: 13a

Led Behandling

A. Obehandlat

B. Bacara

C. Bacara

D. Lexus XPE

E. Bacara, Hussar + Renol

F. Boxer + Bacara, [behovsanpassning]

G. Boxer+Lexus 50 WG+Bacara, [behovsanpassning]

H. Bacara + Hussar + Renol

I. Bacara + Attribut + Hussar + Lissapol Bio

J. Bacara + Atlantis + Hussar + BioPower

K. Monitor + Express + Lissapol Bio

Dos, l/ha

Höst, grödan

1.5 blad

-

1.0

1.25

30g

0.5

1.5 +0.25

1.0 +10g +0.2

-

-

-

-

Dos, l/ha

Vår, tillväxtens

början

-

-

-

-

100g +0.5

?

?

0.3 +200g +0.5

0.3 + 60g + 60g +0.2

0.3 +100g +100g +0.2

18.75g +1tbl +0.2

Bestäl-
lare

ÖSF

SJV

ÖSF

DUP

BAY

SYN

SYN

BAY

BAY

BAY

MON

VÄTSKEMÄNGD 200 L/HA

SPALTSPRIDARE, DUSCHKVALITET MEDIUM

ARBETSTRICK 0.2 MPA (2 KP/KVCM)

BEH VID LUGN VÄDERLEK OCH TORRA BLAD

LÄS PM

BRUTTORUTA: 3 M X 13 M ELLER

4 M X 10 M

ÖNSKVÄRDA OGRÄS: ÅKERVEN, VIOL, VERONIKA
BALDERSBRÅ MM

Rutfördelning i fält

I



II

III

IV

XJADKGFEICB JHBIEAKGDFC DCIGFKJAHBE EHAJCIBKGDFx

Karta över försöksfältet



Försöket ligger ca m i riktning från

Koordinater för kartvisning: N: 6517695 km ; ö: 1559905 km.

Norrpil o Plöjn.rikt. o

Allmänna uppgifter/anvisningar:

BRUTTOYTA: 4 X 12 = 48 M2

SKÖRDEYTA: X = M2

FÖRFRUKT GRÖDA SORT

UTSÄDESMÄNGD

SÅDATUM

ORG. GÖDS: MEDEL KG/HA DATUM

HANDELSGÖDS: MEDEL KG/HA DATUM

NÄRMASTE VÄDERSTN (SMHI):

BEH ENL PLAN (DATUM): 05/007

ÖVRIGA BEH (KEM, MEK):

Graderingar och bestämningar enl PM:

BEH.SKADOR % AV BESTÅND MÅN-DAG RUTVIS

A) MISSFÄRGNINGAR [DSC.S?]

B) NEKROSER [NEC.S?]

C) PLANTDEFORM [PLD.S?]

D) TILLVÄXTHÄMN [GST.S?]

STRÅSTYRKA, SKÖRD [STS.SH] MÅN-DAG RUTVIS

OGRÄSBESTÅND, SKÖRD [WE.SH] MÅN-DAG RUTVIS

RÄSKÖRD, KG/RUTA [Y.KG] MÅN-DAG RUTVIS

OGRÄSRÄKNING ENL PM MÅN-DAG RUTVIS

Fyll i SPRUTJOURNAL NOGGRANT


Utförarens ansvarig:

Namn och telefon:

Kontaktperson vid ÖSF: Lennart Johansson 013-355304, 0708-290831

ADG: 05A767
Plannr: L5-240

D_GRON 1:16558



©Lantmäteriverket, Gävle, 2005

X,Y: 6517185, 1558104

Jordanalys:

ADB-nr: 05A767
Serienr: L5- 240-2006
Län-fnr: D-112-2005

Jordart: mmh I Mj

Mullhalt %: 4.9

Lerhalt %: 13

pH: 6.4

P-AL (mg/100g): 5.4

K-AL (mg/100g): 11.6

Mg-AL (mg/100g): 6.4

K/Mg (mg/100g): 1.81

Ca-AL (mg/100g): 179

K-HCl (mg/100g): 71

Cu-HCl mg/kg): 2.8

P-HCl (mg/100g): 26.9

KI: III

KI: III

KI: 2

Datum

Signering

P.M.

Åkerven och örtogräs i höstvet, höst och vår

1. **Syfte med försöket.** Att visa de provade preparatens verkan mot åkerven och örtogräs.
2. **Preparaten.** Anskaffas och utvägs av Agrilab AB.
3. **Försöksplats.** Välj en plats med jämn och riklig förekomst av åkerven och örtogräs, **obs ! fri från kvickrot**. Försöket skall skyltas, ha hörnpålar och gränsas. Bra karta för snabb lokalisering på fältkortet. Bruttoreta 3 m x 13 m eller 4 m x 10 m.
4. **Jordprov.** Uttas och insänds med tydliga beteckningar till Agrilab AB, Ulls väg 33, 756 51 Uppsala.
5. **Markfuktighet vid behandling.** Ange markfuktigheten i skiktet 1-6 cm som våt, fuktig eller torr.
6. **Sprutjournal.** Fyll i den bifogade sprutjournalen så noggrant som möjligt.
7. **Gradering**
 - a) Behandlingsskador på grödan bestäms genom gradering en till två veckor efter respektive behandling. Ange skadornas art samt andel skadat bestånd i respektive parcell i % av obehandlat led.
 - b) Stråstyrka graderas vid skörd.
 - c) OgräSENS täckningsgrad graderas vid skörd.
8. **Verkan på åkerven och örtogräs.** Bestäms genom en räkning och vägning av ogräsplantorna enl nedan då man klart kan identifiera åkervensplantorna (i vippstadiet). Svårt skadade plantor utan möjlighet att överleva räknas inte.
9. **Ogräsräkning.** Samtliga ogräsarter skall räknas i 4 (eller 2) provrutor om minst 0,25 m² per försöksruta. Ange provrutornas storlek. Provrutorna placeras så, att de så väl som möjligt representerar det genomsnittliga ogräsbeståndet i försöksrutan. Antalet ogräsplantor sammanläs för de 4 provrutorna. Arter där plantantalet är färre än 20 på den sammanlagda räknade ytan i det obehandlade ledet men vikten är 50 g eller högre redovisas separat. Arter med mindre än 20 plantor och vikt lägre än 50 g på den sammanlagda räknade ytan i det obehandlade ledet sammanförs till någon av följande grupper: "övriga ettåriga örtogräs" eller "övriga fleråriga örtogräs" (t. ex hästhov, knölsyska, åkertistel). Skadegräs redovisas separat liksom fräken. Kvickrot skall endast vägas, inte räknas.
Obs! Blanda aldrig in fleråriga örtogräs i gruppen ettåriga örtogräs. Skilj alltid mellan örtogräs och skadegräs!
10. **Ogräsvägning.** Varje art vägs samtidigt med ogräsräkningen och vikten anges i gram. Före vägning befrias plantorna från underjordiska plantdelar. Det ifyllda protokollet insänds snarast möjligt. Ange ev. felbehandling också på ogräsprotokollet.
11. **Skörd.** Rutor på minst 18 m² skördas. Vid tröskningen vägs kärnskörden. Rutvisa kärnprov insänds med tydliga beteckningar till Agrilab AB, Ulls väg 33, 756 51 Uppsala. Ställ alltid in tröskan på den utanför försöket liggande skyddszonen! Ange skörderutans storlek!
12. **Utvecklingsstadier och fältanteckningar.** Använd "Utvecklingsskalor och EPP0 koder", 1996 (Leuchovius och Sturesson). För fullständiga fältanteckningar under hela försökstiden.