



FÄLTKORT

2006 L5- 241

N-546-2005

05A777

Fältforsk, ogräsreglering

Försöksserie: Åkervens och örtogräs i höstvetete, höst och vår

Försöksvärd: Yngve Svensson

Stallberg 310 44 Getinge

Gröda: Höstvetete

Jordbruksomr: 7

A. Obehandlat

B. 15 g Lexus + 0.15 l Bacara + 1.5 l Boxer 1)

C. 1.5 l Boxer + 0.25 l Bacara 1) + [behovsanpassad vårbeh (i samråd med Syngenta)]

D. 1.5 l Boxer + 0.05 l Diflufenikan + [behovsanpassad vårbeh (i samråd med Syngenta)]

E. 0.3 l Bacara 1) + 75 g Hussar + 0.5 l Renol 3)

F. 0.5 l Bacara 1) + 100 g Hussar + 0.5 l Renol 3)

G. 0.5 l Bacara 1) + 150 g Hussar + 0.5 l Renol 3)

H. 0.5 l Bacara 1) + 60 g Attribut + 120 g Hussar + 0.2 l Lissapol Bio 3)

I. 0.5 l Bacara 1) + 12.5 g Monitor + 0.2 l Lissapol Bio 3) (M)

J. 0.5 l Bacara + 150 g Atlantis + 0.3 l BioPower 2)

K. 0.5 l Bacara + 250 g Atlantis + 0.5 l BioPower 2)

L. 0.3 l Bacara + 200 g Hussar + 0.5 l Renol 3)

M. 0.3 l Bacara + 100 g Atlantis + 100 g Hussar + 0.2 l BioPower 3)

N. 18.75 g Monitor + 1.0 tabl (5.0 g) Express + 0.2 l vätmedel 3)

1) Då grödan har 1.5 blad på hösten

BRUTTORUTA: 3 M X 13 M ELLER

2) Då grödan har 2-3 blad på hösten

4 M X 10 M

3) Då grödan är i god tillväxt på våren, ej frostrisk

JÄMN GRÖDA PÅ VATTENHÅLLANDE JORD MED RIKLIG

OCH JÄMN FÖREKOMST AV ÅKERVEN OCH MED EN

VARIERAD OCH RIKLIG ÖRTOGRÄSFLORA. KVICKROT

ELLER ANDRA ROTOGRÄS FÅR EJ FÖREKOMMA.


VÄTSKEMÄNGD 200 L/HA LÄS PM

ARBETSTRYCK 0.2 MPA (2 KP/KVCM)

SPALTSPRIDARE, DUSCHKVALITET MEDIUM

BEH VID LUGN VÄDERLEK OCH TORRA BLAD

Rutfördelning i fält



Koordinater för kartvisning: N: 6299428 ; Ö: 1315672

Allmänna uppgifter/anvisningar:

BRUTTOYTA: 4 X 12 = 48 M2

SKÖRDEYTA: X = M2

FÖRFRUKT GRÖDA SORT

Vårvetete Höstvetete Olivin

UTSÄDESMÄNGD SÅDATUM

ORG. GÖDS: MEDEL KG/HA DATUM

HANDELSGÖDS: MEDEL KG/HA DATUM

NÄRMASTE VÄDERSTN (SMHI): Halmstad

BEH ENL PLAN (DATUM): 20051006, 20060502

ÖVRIGA BEH (KEM, MEK):

Jordprov, general 20051006

Graderingar och bestämningar enl PM:

BEH.SKADOR % AV BESTÅND MÅN-DAG RUTVIS

A) MISSFÄRGNINGAR [DSC.S?] 20051101

B) NEKROSER [NEC.S?]

C) PLANTDEFORM [PLD.S?]

D) TILLVÄXTHÄMN [GST.S?]

STRÅSTYRKA, SKÖRD [STS.SH] MÅN-DAG RUTVIS

OGRÄSBESTÅND, SKÖRD [WE.SH] MÅN-DAG RUTVIS

RÅSKÖRD, KG/RUTA [Y.KG] MÅN-DAG RUTVIS

OGRÄSRÄKNING ENL PM MÅN-DAG RUTVIS

FYLL I SPRUTJOURNAL NOGGRANNT

Utföraransvarig: Namn och telefon: Magnus Håkansson 035-465 25 0708-438204

Kontaktperson: Klas Eriksson 0480-15672, 29454, 0708-965921

Datum

Signering

P.M.

Åkerven och örtogräs i höstvet, höst och vår

1. **Syfte med försöket.** Att visa de provade preparatens verkan mot åkerven och örtogräs.
2. **Preparaten.** Anskaffas och utvägs av Provcentralen.
3. **Försöksplats.** Välj en plats med jämn och riklig förekomst av åkerven och örtogräs, **obs ! fri från kvickrot**. Försöket skall skyltas, ha hörnpålar och gränsas. Bra karta för snabb lokalisering på fältkortet. Bruttoreta 3 m x 13 m eller 4 m x 10 m (4 m x 12 m i H län).
4. **Jordprov.** Uttas och insänds med tydliga beteckningar valfritt laboratorium. Jordartsbetämning, Ph och Al-analys.
5. **Markfuktighet vid behandling.** Ange markfuktigheten i skiktet 1-6 cm som våt, fuktig eller torr.
6. **Sprutjournal.** Fyll i den bifogade sprutjournalen så noggrant som möjligt.
7. **Gradering**
 - a) Behandlingsskador på grödan bestäms genom gradering en till två veckor efter respektive behandling. Ange skadornas art samt andel skadat bestånd i respektive parcell i % av obehandlat led.
 - b) Stråstyrka graderas vid skörd.
 - c) Ogräsens täckningsgrad graderas vid skörd.
8. **Verkan på åkerven och örtogräs.** Bestäms genom en räkning och vägning av ogräsplantorna enl nedan då man klart kan identifiera åkervensplantorna (i vippstadiet). Svårt skadade plantor utan möjlighet att överleva räknas inte.
9. **Ogräsräkning.** Samtliga ogräsarter skall räknas i 4 (eller 2) provrutor om minst 0,25 m² per försöksruta. Ange provrutornas storlek. Provrutorna placeras så, att de så väl som möjligt representerar det genomsnittliga ogräsbeståndet i försöksrutan. Antalet ogräsplantor sammanläs för de 4 provrutorna. Arter där plantantalet är färre än 20 på den sammanlagda räknade ytan i det obehandlade ledet men vikten är 50 g eller högre redovisas separat. Arter med mindre än 20 plantor och vikt lägre än 50 g på den sammanlagda räknade ytan i det obehandlade ledet sammanförs till någon av följande grupper: "övriga ettåriga örtogräs" eller "övriga fleråriga örtogräs" (t. ex hästhov, knölsyska, åkertistel). Skadegräs redovisas separat liksom fräken. Kvickrot skall endast vägas, inte räknas.
Obs! Blanda aldrig in fleråriga örtogräs i gruppen ettåriga örtogräs. Skilj alltid mellan örtogräs och skadegräs!
10. **Ogräsvägning.** Varje art vägs samtidigt med ogräsräkningen och vikten anges i gram. Före vägning befrias plantorna från underjordiska plantdelar. Det ifyllda protokollet insänds snarast möjligt. Ange ev. felbehandling också på ogräsprotokollet.
11. **Skörd.** Rutor på minst 18 m² skördas. Vid tröskningen vägs kärnskorde. Kärnprov om exakt 1000 g från varje försöksled (4 sammanslagna delprov) insänds med tydliga beteckningar till valfritt laboratorium för bestämning av avrens, vattenhalt, rymdvikt och tusenkornvikt samt protein och stärkelse om NIT-kalibrering finns på laboratoriet. Ställ alltid in tröskan på den utanför försöket liggande skyddszonen! Ange skörderutans storlek!
12. **Utvecklingsstadier och fältanteckningar.** Använd "Utvecklingsskalor och EPPO koder", 1996 (Leuchovius och Stureson). För fullständiga fältanteckningar under hela försökstiden.