

A. Obehandlat

- B. 0.25 l Bacara 1) + 50 g Hussar + 0.5 l Renol 2)
C. 0.5 l Bacara 1) + 100 g Hussar + 0.5 l Renol 2)
D. 1.5 tabl Express + 0.6 l Starane 180 + 0.1 l Vätmedel 2) (M)
E. 0.3 l Bacara + 100 g Hussar + 0.5 l Renol 2)
F. 0.3 l Bacara + 150 g Hussar + 0.5 l Renol 2)
G. 2 tabl DPX-CDQ 73 + 0.05 % Vätmedel 2)
H. 3 tabl DPX-GBF 92 + 0.05 % Vätmedel 2)

- 1) Då grödan har 1.5 blad på hösten
2) Då grödan är i god tillväxt på våren, ej frostrisk

BRUTTORUTA: 3 M X 13 M ELLER
4 M X 10 M

JÄMN GRÖDA PÅ VATTENHÅLLANDE JORD MED RIKLIG OCH VARIERAD ÖRTOGRÄSFLORA.
GRÄS ELLER ROTOGRÄS FÅR EJ FÖREKOMMA PÅ FÖRSÖKSPLATSEN.

VÄTSKEMÄNGD 200 L/HA

SPALTSPRIDARE, DUSCHKVALITET MEDIUM

ARBETSTRYCK 0.2 MPA (2 KP/KVCM)


BEH VID LUGN VÄDERLEK OCH TORRA BLAD

LÄS PM

Rutfördelning i fält

I II III IV
XEFHBGDAC ACGFHEBD BDEACFHG GCDEBAFHx

Karta över försöksfältet



Försöket ligger ca m i riktning från
Koordinater för kartvisning: N: 638930

km; ö: 165735

Norrpil o Plöjn.riktn. o

Allmänna uppgifter/anvisningar:

BRUTTOYTA: 3,0 x 15,0 = 45,0 M2

SKÖRDEYTA: X = M2

FÖRFRUKT GRÖDA SORT
korn höstvet Gnejs

UTSÄDESMÄNGD SÅNATUM

ORG. GÖDS: MEDEL KG/HA DATUM

HANDELSGÖDS: MEDEL KG/HA DATUM

NÄRMASTE VÄDERSTN (SMHI):

Visby Högskola

BEH ENL PLAN (DATUM):
1:a 10-07

ÖVRIGA BEH (KEM, MEK):

Graderingar och bestämningar enl PM:

BEH.SKADOR & AV BESTÅND MÅN-DAG RUTVIS

A) MISSFÄRGNINGAR [DSC.S?]

B) NEKROSER [NEC.S?]

C) PLANTDEFORM [PLD.S?]

D) TILLVÄXTHÄMN [GST.S?]

STRÅSTYRKA, SKÖRD [STS.SH] MÅN-DAG RUTVIS

OGRÄSBESTÅND, SKÖRD [WE.SH] MÅN-DAG RUTVIS

RÅSKÖRD, KG/RUTA [Y.KG] MÅN-DAG RUTVIS

OGRÄSRÄKNING ENL PM MÅN-DAG RUTVIS

FYLL I SPRUTJOURNAL NOGGRANNT


Utföraransvarig:

Namn och telefon:

Bo Pettersson, 0498-20 22 45, 070-775 76 34

Kontaktperson:

Klas Eriksson 0480-15672, 29454, 0708-965921



Datum

Signering

P.M.

Bekämpning av örtogräs i höstvet, höst och vår

1. **Syfte med försöket.** Att visa de provade preparatens verkan mot örtogräs i höstvet.
2. **Preparaten.** Anskaffas och utvägs av Provcentralen.
3. **Försöksplats.** Välj en plats med jämn och riklig förekomst av örtogräs, helst fri från kvickrot. Försöket skall skyltas, ha hörnpålar och gränsas! Bra karta för snabb lokalisering på fältkortet. Bruttoreta = 3 m x 13 eller 4 m x 10 m (4 m x 12 m i H län).
4. **Jordprov.** Uttas och insänds med tydliga beteckningar till valfritt laboratorium. Jordartsbetämning, Ph och Al-analys.
5. **Markfuktighet vid behandling.** Ange markfuktigheten i skiktet 1-6 cm som våt, fuktig eller torr.
6. **Gradering.** a) Behandlingsskador på grödan graderas en till två veckor efter respektive behandling. Ange skadornas art samt andel skadat bestånd i respektive parcell i % av obehandlat led.
b) Stråstyrka graderas vid skörd.
c) Ogräsens täckningsgrad graderas vid skörd.
7. **Verkan på ogräset.** Bestäms genom en räkning och vägning av överlevande ogräsplantor enligt nedan ca 5 veckor efter vårbehandling eller då full effekt kan anses ha erhållits. Svårt skadade plantor utan möjlighet att överleva räknas inte.
8. **Ogräsräkning.** Samtliga ogräsarter skall räknas i 4 (eller 2) provrutor om minst 0,25 m² per försöksruta. Ange provrutornas storlek. Provrutorna placeras så, att de så väl som möjligt representerar det genomsnittliga ogräsbeståndet i försöksrutan. Antalet ogräsplantor sammanläs för de 4 provrutorna. Arter där plantantalet är färre än 20 på den sammanlagda räknade ytan i det obehandlade ledet men vikten är 50 g eller högre redovisas separat. Arter med mindre än 20 plantor och vikt lägre än 50 g på den sammanlagda räknade ytan i det obehandlade ledet sammanförs till någon av följande grupper: "övriga ettåriga örtogräs" eller "övriga fleråriga örtogräs" (t. ex hästhov, knölsyska, åkertistel). I det fall plantantalet är färre än 20 plantor skadegräs redovisas separat liksom fräken. Kvickrot och andra skadegräs skall endast vägas, inte räknas.
Obs! Blanda aldrig in fleråriga örtogräs i gruppen ettåriga örtogräs. Skilj alltid mellan örtogräs och skadegräs!
9. **Ogräsvägning.** Varje art vägs samtidigt med ogräsräkningen och vikten anges i gram. Före vägning befrias plantorna från rötter. Det ifyllda protokollet insänds snarast möjligt. Ange ev felbehandling också på ogräsprotokollet.
10. **Skörd.** Rutor på minst 18 m² skördas. Vid tröskningen vägs kärnsköörden. Kärnprov om exakt 1000 g från varje försöksled (4 sammanslagna delprov) insänds med tydliga beteckningar till valfritt laboratorium för bestämning av avrens, vattenhalt, rymdvikt och tusenkornvikt samt protein och stärkelse om NIT-kalibrering finns på laboratoriet. Ställ alltid in tröskan på den utanför försöket liggande skyddszonen! Ange skörderutans storlek!
12. **Utvecklingsstadier och fältanteckningar.** Använd "Utvecklingsskalor och EPPO-koder", 1996 (Leuchovius och Sturesson). För fullständiga fältanteckningar under hela försökstiden.