



# FÄLTKORT

2007 L5- 307

N-547-2006

05A846

Inst för växtproduktionssekologi, ogräsreglering

Försöksserie: Örtogräs i höstvete, höst och vår

Försöksvärd: Yngve Svensson

Stallberg

310 44 Getinge

Gröda: Höstvete

Jordbruksomr: 7

A. Obehandlat [Animaliebältet]

B. 0.3 l Bacara 1) + 50 g Hussar + 0.5 l Renol 2) [SJV]

C. 0.3 l Bacara 1) + 100 g Hussar + 0.5 l Renol 2) [BAY]

D. 0.3 l Bacara + 100 g Hussar + 0.5 l Renol 2) [BAY]

E. 0.3 l Bacara + 150 g Hussar + 0.5 l Renol 2) [BAY]

F. 1.5 tabl Express 50 T + 0.6 l Starane 180 + 0.1 l vätmedel 2) [Animaliebältet]

1) Då grödan är i stadium DC 10-12 på hösten

BRUTTORUTA: 3 M X 13 M ELLER

2) Då grödan är i god tillväxt på våren, ej frostrisk

4 M X 10 M

JÄMN GRÖDA PÅ VATTENHÅLLANDE JORD MED RIKLIG OCH VARIERAD ÖRTOGRÄSFLORA.

GRÄS ELLER ROTOGRÄS FÅR EJ FÖREKOMMA PÅ FÖRSÖKSPLATSEN.

VÄTSKEMÄNGD 200 L/HA

ARBETSTRYCK 0.2 MPA (2 KP/KVCM)

LÄS PM

SPALTSPRIDARE, DUSCHKVALITET MEDIUM

BEH VID LUGN VÄDERLEK OCH TORRA BLAD

Rutfördelning i fält

|         |        |        |         |
|---------|--------|--------|---------|
| I       | II     | III    | IV      |
| xBDCFAE | DAECFB | CFBDEA | DBFEACx |

Karta över försöksfältet

Försöket ligger ca m i riktning från

Norrpil o Plöjn.riktn. o

Koordinater för kartvisning: N:629 8976 km ; ö:131 7034 km.

Allmänna uppgifter/anvisningar:

BRUTTOYTA: 4 X 12 = 48 M2

SKÖRDEYTA: 2 X 10 = 20 M2

FÖRFRUKT GRÖDA SORT

Höstvete Höstvete Talsa

UTSÄDESMÄNGD SÅDATUM

ORG. GÖDS: MEDEL KG/HA DATUM

HANDELSGÖDS: MEDEL KG/HA DATUM

NÄRMASTE VÄDERSTN (SMHI):

BEH ENL PLAN (DATUM): 1. enl. plan

ÖVRIGA BEH (KEM, MEK):

Graderingar och bestämningar enl PM:

BEH.SKADOR % AV BESTÅND MÅN-DAG RUTVIS  
061023

A) MISSFÄRGNINGAR [DSC.S?] 0

B) NEKROSER [NEC.S?] 0

C) PLANTDEFORM [PLD.S?] 0

D) TILLVÄXTHÄMN [GST.S?] 0

STRÅSTYRKA, SKÖRD [STS.SH] MÅN-DAG RUTVIS

OGRÄSBESTÅND, SKÖRD [WE.SH] MÅN-DAG RUTVIS

RÅSKÖRD, KG/RUTA [Y.KG] MÅN-DAG RUTVIS

OGRÄSRÄKNING ENL PM MÅN-DAG RUTVIS

FYLL I SPRUTJOURNAL NOGGRANNT

Utföraransvarig: Namn och telefon:Magnus Håkansson 035-465 25 0708-438204

Kontaktperson: Klas Eriksson 0480-15672, 29454, 0708-965921

Datum .....

Signering .....

P.M.

Bekämpning av örtogräs i höstvet, höst och vår

1. **Syfte med försöket.** Att visa de provade preparatens verkan mot örtogräs i höstvet.
2. **Preparaten.** Anskaffas och utvägs av Hushållningssällskapet, Sandby Gård, Borby.
3. **Försöksplats.** Välj en plats med jämn och riklig förekomst av örtogräs, helst fri från kvickrot. Försöket skall skyltas, ha hörnpålar och gränsas! Bra karta för snabb lokalisering på fältkortet. Bruttoruta = 3 m x 13 eller 4 m x 10 m (4 m x 12 m i H län).
4. **Jordprov.** Uttas och insänds med tydliga beteckningar till valfritt laboratorium. Jordartsbetämning, Ph och Al-analys.
5. **Markfuktighet vid behandling.** Ange markfuktigheten i skiktet 1-6 cm som våt, fuktig eller torr.
6. **Sprutjournal.** Fyll i den bifogade sprutjournalen så noggrant som möjligt.
7. **Gradering.** a) Behandlingsskador på grödan graderas en till två veckor efter respektive behandling. Ange skadornas art samt andel skadat bestånd i respektive parcell i % av obehandlat led.  
b) Stråstyrka graderas vid skörd.  
c) Ogräsens täckningsgrad graderas vid skörd.
8. **Verkan på ogräset.** Bestäms genom en räkning och vägning av överlevande ogräsplantor enligt nedan ca 5 veckor efter vårbehandling eller då full effekt kan anses ha erhållits. Svårt skadade plantor utan möjlighet att överleva räknas inte.
9. **Ogräsräkning.** Samtliga ogräsarter skall räknas i 4 (eller 2) provrutor om minst 0,25 m<sup>2</sup> per försöksruta. Ange provrutornas storlek. Provrutorna placeras så, att de så väl som möjligt representerar det genomsnittliga ogräsbeståndet i försöksrutan. Antalet ogräsplantor sammanslås för de 4 provrutorna. Arter där plantantalet är färre än 20 på den sammanlagda räknade ytan i det obehandlade ledet men vikten är 50 g eller högre redovisas separat. Arter med mindre än 20 plantor och vikt lägre än 50 g på den sammanlagda räknade ytan i det obehandlade ledet sammanförs till någon av följande grupper: "övriga ettåriga örtogräs" eller "övriga fleråriga örtogräs" (t. ex hästhov, knölsyska, åkertistel). I det fall plantantalet är färre än 20 plantor Skadegräs redovisas separat liksom fräken. Kvickrot och andra skadegräs skall endast vägas, inte räknas.  
**Obs! Blanda aldrig in fleråriga örtogräs i gruppen ettåriga örtogräs. Skilj alltid mellan örtogräs och skadegräs!**
10. **Ogräsvägning.** Varje art vägs samtidigt med ogräsräkningen och vikten anges i gram. Före vägning befrias plantorna från rötter. Det ifyllda protokollet insänds snarast möjligt. Ange ev felbehandling också på ogräsprotokollet.
11. **Skörd.** Rutor på minst 18 m<sup>2</sup> skördas. Vid tröskningen vägs kärnskorde. Rutvisa kärnprov insänds med tydliga beteckningar till valfritt laboratorium för bestämning av avrens, vattenhalt, rymdvikt och tusenkornvikt samt protein och stärkelse om NIT-kalibrering finns på laboratoriet. Ställ alltid in tröskan på den utanför försöket liggande skyddszonen! Ange skörderutans storlek!
12. **Utvecklingsstadier och fältanteckningar.** Använd "Utvecklingsskalor och EPPO-koder", 1996 (Leuchovius och Stureson). För fullständiga fältanteckningar under hela försökstiden.