



FÄLTKORT

2010 OS5-8010

E-207-2009

05B013

Inst för växtproduktionsökologi, ogräsreglering

Försöksserie: Örtogräsbekämpning i höstraps i Mellansverige.

Försöksvärd:

Axel Lagerfelt 0208-299778
Telefon 58599 Linköping

Gröda: Höstraps

Jordbruksomr: _____

Led Produkt	Dos, l/ha, tidpunkt					Beställare
	1)	2)	3)	4)	5)	
A. Obehandlat	-	-	-	-	-	Svensk Raps
B. Nimbus	2.0	-	-	-	-	SJV
C. Nimbus	3.0	-	-	-	-	BASF
D. Butisan Top	2.0	-	-	-	-	BASF
E. 0808 och Matrigon	0.25	-	-	1.0	-	NA
F. 0808	0.33	-	-	-	-	NA
G. Butisan Top och Galera + D4501	-	1.25	-	-	0.3 + 0.3	Dow
H. Butisan Top [mätare]	-	2.0	-	-	-	Svensk Raps
I. Fox och Matrigon	-	-	1.0	1.0	-	Svensk Raps / SJV
J. Fox + Matrigon	-	-	1.0+0.5	-	-	Machteshim
K. Galera + D4501	-	-	-	-	0.3 + 0.3	Dow

Idp: 1) Senast 3 dygn efter sådd. 2) Grödans hjärtbladsstad. 3) Grödans DC 13 (minst 2 fullt utvecklade örtblad). 4) På våren när tillväxten börjat med lufttemp över 8°C. 5) Grödans DC 30-40 på våren när tillväxten börjat med lufttemp över 8°C.

Vätskemängd: 150-200 L/HA

Körhastighet: 4-6 km/h

Duschkvalitet: Medium

Munstycke: Hardi ISO LD-015-110 alt Hardi ISO LD-02-110

ruttoruta: 200 kvm / försöksled BEH VID LUGN VÄDERLEK OCH TORRA BLAD LÄS PM

Ogräs: Örtogräs där minst baldersbrå och snärjmåra förekommer. Ogräsräkn höst och vår.

HELA FÖRSÖKET BEH MOT SPILLSÄD OM FÖRFRUKTEN ÄR STRÄSÄD. Utläggs på styvare jord.

Rutfördelning i fält

I	II	III	IV
XKCDIHFGJBEA	IBFECKGADJH	AFJGEIBKHCD	BHIKJAFEGDCx

Karta över försöksfältet på bilaga

Försöket ligger ca m i riktning från

Koordinater för kartvisn (SWEREF99): N: 527673 km ; Ö: 6475489

Allmänna uppgifter/anvisningar:

BRUTTOYTA:	12 x 3	=	M2
SKÖRDEYTA:	X	=	M2
FÖRFRUKT	GRÖDA		SORT

UTSÄDESMÄNGD	SÅDATUM
--------------	---------

ORG. GÖDS:	MEDEL	KG/HA	DATUM
------------	-------	-------	-------

HANDELSGÖDS:	MEDEL	KG/HA	DATUM
--------------	-------	-------	-------

NÄRMASTE VÄDERSTN (SMHI):

BEH ENL PLAN (DATUM): 08-19 FL/NA
08-27 FL/MW 09-11 SA/PL 09-29 FL/TH
SKÖRD F BEH, STUBB/TRÄDA, DATUM:

PLÖJN E SKÖRD, STUBB/TRÄDA, DATUM:

ÖVR BEH (KEM, MEK (ÄVEN EV SPILLSÄD)):

Grapes 08-19 FLGraderingar och bestämmingar enl PM: 7

BEH.SKADOR & AV BESTÅND MÅN-DAG RUTVIS

A) MISSFÄRGNINGAR [DSC.S?]

09-03 SA 09-17 FL/TH

B) NEKROSER [NEC.S?]

09-17 FL/TH

C) PLANTDEFORM [PLD.S?]

D) TILLVÄXTHÄMN [GST.S?]

GRÖDANS BESTÅND [PLS.SS] MÅN-DAG RUTVIS

STJÄLKSTYRKA, SKÖRD [STS.SH] MÅN-DAG RUTVIS

OGRÄSBESTÅND, SKÖRD [WE.SH] MÅN-DAG RUTVIS

RÅSKÖRD, KG/RUTA [Y.KG] MÅN-DAG RUTVIS

OGRÄSRÄKNING ENL PM MÅN-DAG RUTVIS

FYLL I SPRUTJOURNAL NOGGRANNT

Utföraransvarig: Namn och telefon: Fredrik Larsson 013-60195

Kontaktperson: Svensk Raps, Albin Gunnarsson 070-5686027

Gränsat 04-20 AE, SL MW

OBS! Journalen måste fyllas i med beständig skrift, t.ex. kulspeppenna.
Noteringar kan göras på en blank baksida. Noteringarna måste dateras/signeras. Spruttillfälle anges.

ADB-nr Plan-nr Försöks-nr		Sprut-journal			
05 B013 OS5-8010 E-204-2009					
Spruttillfälle - nr: datum (år,mån,dag)		1:090819	2:090821	3:090911	4:10-04-29
Sprutning utförd av (signatur)		FL/JA	FL/min	FL/17H	5:
Behandlade försöksled (ex. A,C,E etc.)		B-F	6-14	7-11	6:
Typ av spruta		Sprut 2500			
Spridare: typ, tryck		Hardo Ldd2-100			
Tid på dagen		10 ⁰⁰ -11 ⁰⁰			
Grödans utvecklingsstadium (decimalskalan)		—	10	1930-1450	11-12 ⁰⁰
Grödans täthet (gles, normal, tät)		—	Normal	2.5 skd	30
Ogräsets utveckling		—	—	pet	Normal
Ogräsbestånd (glost, normalt, tät)		—	—	2-4 blöd	16-30
Tillväxthastighet (låg, normal, hög) *		Normal	—	Normal	Normal
Temperatur, °C (30 cm ovan mark)		17.2	20.6	18.3	18.4
Rel. fuktighet % (30 cm ovan mark)		57.7	65.0	47.2	57.7
Markfuktighet (våt, normal, torr)		Normal	Våt	Tvågata Lätt att gå på	Normal
Molnighet, %		0	90	80	95
Vindhastighet i ögonhöjd (ca 2 m ovan mark)		—	0.8	1.0	3.8
Vindriktning över rutorna (längs, tvärs, diagonal)		—	diagonal	vest	vest
Dagg (mycket, måttlig, ingen)		—	Mycket	ingen	ingen
Förekomst av frost eller torka (ja, nej)		nej	nej	nej	nej
Regnfrti tid efter behandling (>20 anges vid över 20 t					
Övrigt (avvikelser och problem)		Jordtemp 12.9°C	Jordtemp 15.5°C	Jordtemp 16.2	Jordtemp 12.9

*) Tillväxthastighet vanligen hög vid hög temperatur och god markfuktighet under längre tid, låg vid kallt och torrt väder.