

**FÄLT KORT**
SkåneförsökenFörsöksserie: **Tidpunktens betydelse för behandligseffekten i höstvet**

Försöksvärd:

Adress:

Höstvete

Telefon:

Koordinater X:

Y:

Led Behandling	Dos/ha och tidpunkt(DC)				Bestäl
	31-32	37-39	47-51	55-59	
A.Obehandlat	-	-	-	-	Skåne
B.Stereo och Proline+Comet(sortförsök)	2,0	-	0,6+0,25	-	Skåne
C.Stereo och Proline+Comet(sortförsök)	-	2,0	-	0,6+0,25	Skåne
D.Stereo och TiltTop+Proline	-	1,0	-	0,4+0,2	MAK
E.TiltTop+Proline och TiltTop+Proline	-	0,4+0,2	-	0,4+0,2	MAK
F.Flexity + Juventus och Juventus	0,25+0,25	-	0,5	-	BASF
G.Comet Plus + Juventus och Juventus	-	0,5+0,5	-	0,5	BASF
H.Amistar + Tilt + Bravo och Proline	-	0,25+0,15+1,0	-	0,4	Syng
I.Proline+Comet och Proline	-	0,2+0,125	-	0,2	SJV
J.Proplant enl besked					SJV

Rutfördelning i fält

III-IV	A F G H E J C B I D	J E H A I C D G B F
	21 30	31 40
I-II	G J C F B D I H E A	I D B C A E G F H J
	1 10	11 20

Försöket ligger ca m i riktning från

Norrpil o Plöjningsriktning o

Bruttoyta x = m²Skördeyta x = m²

Sådd: Sort: Jordprov:

Förfrukt år 05: 04: 03:

Gödsling Medel Mängd/ha Datum

Bekämpn. ogräs Medel Mängd/ha Datum

Bekämpn. insekt Medel Mängd/ha Datum

Besprutning enl plan, datum och DC
1: 2: 3: 4:

Skörd [Y.KG], Fältvh [MC.F] Datum

Svampsjukdomar graderas vid spruttillfällena i A-rutorna enl. graderingsprotokoll A samt i samtliga rutor 2-4 veckor efter sista angivna spruttillfälle, se PM

Svartpricksjuka % [SEPTTR??LA?]
Vetets bladfläcksjuka (DTR) % [DRECSP??LA?]
Mjöldagg % [ERYSGR??LA?]
Brunrost % [PUCCRE??LA?]
Gulrost % [PUCCST??LA?]
(??=DC och LA?=bladnivå)

Stråknäckarprov uttages rutvis vid DC 75-77 i försöksled A, B och F, se PM

Torkskada % [DAD] rutvis
Grönskott vid skörd % [SH.GN] rutvis
Stråstyrka vid skörd % [STS.SH] rutvis

Vid skörd, ledvisa skördeprov för analys

Kontaktperson - beställare:
Harriet Blohmé 046-713650, 0708-161050
Arne Ljungars 044-229902, 0708-945352

Utförare-ansvarig: