



FÄLTKORT

Skördeår

2007

Plan-nr

L15-8440

Försöks-nr

E-122-2007

ADB-nr

151688

SLU, Växtskyddsbiologi, Alnarp

Försöksserie: Preparatjämförelse, strategi för bekämpning av bomullsmögel

Försöksvärd: Rune & Roger Carlsson

Adress: Hyttringe 59033 Boråsberg

Höstraps


Telefon: 070-620 8046

Koordinater X: 6486230 Y: 1465340

Led	Behandling	Dos/l,kg/ha	Behandlingstidpunkt	Beställare
A.	Obehandlat	-	-	Region
B.	Sportak	1,0	Full blom	Region/VSC
C.	Amistar	1,0	Full blom	Region/VSC
D.	Amistar	0,5	Full blom	Syngenta
E.	Cantus	0,5	Full blom	BASF
F.	Cantus	0,25	Full blom	Svensk Raps

Rutfördelning i fält

III-IV	D A E B F C	E D C A B F
	13 18 19 24	
I-II	B F D E C A	B E F D A C
	1 6 7 12	



Försöket ligger ca m i riktning från
Bruttoyta x = m²

Norrpil o Plöjningsriktning o
Skördeyta x = m²

Sort:	Sådatum:
Jordprov datum:	
Förfrukt år 06:	05: 04:
Medel	Mängd/ha Datum
Bekämpn. ogräs	Medel Mängd/ha Datum
Bekämpn. insekter	Medel Mängd/ha Datum
Besprutning enl plan, datum och DC	
Skörd [Y.KG] Datum	
Gränsat 03-04 AE	
Kontaktperson-besvarellare	

Gradering av svampsjukdomar görs av VSC

Skilj rutorna senast 2 veckor före skörd

Datum för mognad, mån-dag[DDR] ledvis
Förskada % [DAD] rutvis
Grönskott skörd 0-100 [SH.GN] rutvis
Stjälkstyrka vid skörd % [STS.SH] rutvis

Vid skörd, rutvisa skördeprov för analys

Utförarens ansvarig:

ADB-nr Plan-nr Försöks-nr		Sprut-journal					
		1:	2:	3:	4:	5:	6:
Spruttillfälle - nr: datum (år,mån,dag):		1:070510					
Sprutning utförd av (signatur)		T/L/M/S					
Behandlade försöksled (ex. A,C,E etc.)		B-F					
Typ av spruta		gördy 2500					
Spridare: typ, tryck		Hardi 02-110					
Tid på dagen		13 ⁰⁰ -13 ⁵⁰					
Grödans utvecklingsstadium (decimalskalan)		65					
Grödans täthet (gles, normal, tät)		Normal					
Ogräsens utveckling		—					
Ogräsbestånd (glost, normalt, tät)		—					
Tillväxthastighet (låg, normal, hög) *		Normal					
Temperatur, °C (30 cm ovan mark)		14,2					
Rel. fuktighet % (30 cm ovan mark)		53,8					
Markfuktighet (våt, normal, torr)		torr					
Molnighet, %		95					
Vindhastighet i ögonhöjd (ca 2 m ovan mark)		1,5					
Vindriktning över rutorna (längs, tvärs, diagonalt)		tvärs					
Dagg (mycket, måttlig, ingen)		max 11,4					
Förekomst av frost eller torka (ja, nej)		nej					
Regnfri tid efter behandling (>20 anges vid över 20)							
Övrigt (avvikelser och problem)							

*) Tillväxthastighet vanligen hög vid hög temperatur och god markfuktighet under längre tid, låg vid kallt och torrt väder