



Skördeår 2010 Plan-nr L15-2011 Försöks-nr H-15-2010 ADB-nr 152083

SLU, Växtskyddsbiologi, Alnarp

Försöksserie: Strategiförsök i rågvete mot gulrost

Försöksvärd: Bröderna Hasselbom

Adress: Smedby, Stora Smedby 422, 38062 Möckbylängr

Telefon: 070-5456269 WGS 84: 56.40822

16.41603

Sweref99 NORD: 6252414 Sweref99 ÖST: 587378

Led Behandling

	Dos/ha och tidpunkt (DC)					Region
	24-30	31-(32)	37-39	45-49	55-59	
A. Obehandlat	-	-	-	-	-	BASF
B. Proline+Jenton & Proline+Comet	-	0,2+1,0	-	0,2+0,5	-	Bayer
C. Delaro och Delaro	-	0,5	-	0,5	-	MA
D. Tilt & Stereo+Amistar & Tilt	-	0,25	0,4-0,25	-	0,5	MA
E. Tilt & Tilt & Tilt	-	0,25	0,25	-	0,5	Vsc
F. Tilt Top & Tilt Top & Tilt Top	-	0,25	0,25	-	0,5	Vsc
G. Tilt Top & Tilt Top & Jenton	-	0,25	0,25	-	0,5	Vsc
H. Tilt Top & Tilt Top+Comet & Jenton	-	0,25	0,25+0,25	-	0,5	Vsc
I. Tilt Top & Proline+Comet & Jenton	-	0,25	0,2+0,25	-	0,5	Vsc
J. Tilt Top & Proline+Comet	-	0,25	-	0,2+0,25	-	Vsc
K. Öppet led*)						
Förslag: Tilt T & Tilt T & Jenton	0,25	-	0,25	-	0,5	Vsc

*) Öppet led bekämpas enligt förslag i Skåne och Animaliebältet i fält med tidiga angrepp av gulrost. I ÖSF och FiV enl. förslag om fält med tidiga angrepp hittas (kontakta Vsc)


Rutfördelning i fält

III-IV	E G A I K B D C H J F	H A B K J E F I C D G
23	33	34
I-II	I F D C H J B K E G A	C D I H G K J B F A E
1	11	12

Mot Kaståsa

Kalmarväg

Mot Degerhamn



Gården

Smedby kyrka

Mot Fågelstaden

väg 136

Mot öppenby

Försöket ligger ca 750m i NV riktning från kyrkan Norrpil Plöjningsriktning ←→

Bruttoyta 4m x 12m = 48 m² Skördeyta x = m²

Sort: Dinaro, 164kg/ha Sådd: 26/9-2009

Förfrukt år 09: Brunkörn 08: Vårkorn 07:

Jordprov: Plöjt? (Ja/Nej)

Gödsling Medel Mängd/ha Datum
N 27-4 325 10/4-2010
Mangan kväve 15g/l 7,2 25/4-2010

Bekämpn. ogräs Medel Mängd/ha Datum
N 27-4 325 10/4-2010
Bacara 0,5 hösten 2009
Hussur 126g 25/4-2010

Bekämpn. insekt Medel Mängd/ha Datum

Besprutning enl plan, datum och DC

1: 25/4-2010 DC 23 2: 11/5 3: 4:

Leck. Tilt Top 0,25 DC 31

Skörd [Y.KG] Datum

Svampsjukdomar graderas vid spruttillfällena i A-rutorna, gradera gulrost vid DC23-30 och DC31-32 enl. punkt 7 i PM.
Fr.o.m. DC31-32 gradera även enl. graderingsprotokoll A, samt i samtliga rutor 2-3 veckor efter behandling DC55-59.

Gulrost ax % yta [PUCCST??EP]
Gulrost % [PUCCST??LA?]
Brunrost % [PUCCRE??LA?]
Svartpricksjuka % [SEPTTR??LA?]
Vetets bladfläcksjuka (DTR) % [DRECS??LA?]
Sköldfläcksjuka % [RHYNSE??LA?]
Mjöldagg % [ERYSGR??LA?]
(??=DC och LA?=bladnivå)

Hela försöket behandlas mot insekter i DC 45-49 med Pirimor + pyretroid

Torkskada % [DAD] rutvis
Stråstyrka vid skörd % [STS.SH] rutvis

Vid skörd, rutvisa skördeprov för analys

Kontaktperson:

Per-Göran Andersson 046-713650, 0708-161050

Fältdata till: Lennart.Palsson@ltj.slu.se

Utföraransvarig: Klas Eriksson

0702-876363, 0480-15670
0480-23599