




Led
A.Obehandlat
B.1,35 l/ha MCPA + 1,8 l/ha Duplosan Meko
C.0,3 l/ha Cougar + 0,3 l/ha Starane
D.0,5 l/ha Starane + 0,5 l/ha Cougar
E.15 g/ha Gratil + 30 g/ha Ally Class
F.0,1 l/ha Primus + 0,1 l/ha Lissapol Bio
G.0,35 l/ha Starane 180 + 35 g/ha Ally Class
H.1,5 tabl./ha Express + 0,6 /ha Starane 180,+ 0,1 /ha Lissapol Bio
I.50 g/ha Ally Class
J.15 g/ha Gratil + 1,5 tabl./ha Express + 0,1 l/ha Lissapol Bio
K.10 g/ha Gratil + 0,75 tabl./ha Express + vätm 0,1 l/ha

Tidpunkt när tillväxten startat, > 5°C och lägsta temp. under dygnet > 0°C.

Rutfördelning i fält
Block I-IV
DAICHKJFGBE AKEDGBCFHJI JIHDCEGAKBF AFGHJBDIEKC



Försöket ligger ca 300 m i N riktning från Skolan Norrpil o Plöjn.riktn. o

Allmänna uppgifter/anvisningar	Graderingar och bestämningar
BRUTTOYTA: 3 x 16 = M2	
NETTOYTA: X = M2	Behandlingsskador antecknas
Förfrukt Sort	
Vall Tarso Pinnato	Ogräsgradering enl. GEP SF
Sådd	
Jordprov, general	
Behandling 05 06	
010710 JE Roundup	Rutvis skörd, ledvis skördeprov
20 ton lasty nov 500 kss 04-15 450 kss 05-13	
Fyll i separat sprutjournal!	Analys, standard
15°C 55%h 1m/s st 30	