



Led

A. Obehandlat

B. 1,35 l/ha MCPA + 1,8 l/ha Duplosan Meko

C. 0,3 l/ha Cougar + 0,3 l/ha Starane

D. 0,5 l/ha Starane + 0,5 l/ha Cougar

E. 15 g/ha Gratil + 30 g/ha Ally Class

F. 0,1 l/ha Primus + 0,1 l/ha Lissapol Bio

G. 0,35 l/ha Starane 180 + 35 g/ha Ally Class

H. 1,5 tabl./ha Express + 0,6 /ha Starane 180, + 0,1 /ha Lissapol Bio

I. 50 g/ha Ally Class

J. 15 g/ha Gratil + 1,5 tabl./ha Express + 0,1 l/ha Lissapol Bio


K. 10 g/ha Gratil + 0,75 tabl./ha Express + vätm 0,1 l/ha

Tidpunkt när tillväxten startat, > 5°C och lägsta temp. under dygnet > 0°C.

Ruttfördelning i fält

Block I-IV

GCBIJAHDEKF JFAGCEIBDKH BFGKCDHEIAJ DKBHAFJIGEC

☐ ☐
Karta över försöksfältet

Försöket ligger ca 600 m i SV riktning från

Norrpil Plöjn. riktn. o

Allmänna uppgifter/anvisningar

BRUTTOYTA: 4 x 12,5 = 50 M2

NETTOYTA: x = M2

Förfrukt Sort

Sådd

Jordprov, general

Behandling 7/5-02

Fyll i separat sprutjournal!

Graderingar och bestämningar

Behandlingsskador antecknas

Ogräsgradering enl. GEP SF

Rutvis skörd, ledvis skördeprov

Analys, standard