



FÄLT Kort 2007 L5-247-06V

E-170-2006

F35516

Hushållningssällskapet

Försöksserie: Selektivitet för gräsherbicider i höstvet

Försöksvärd:

Adress:

Anders

Gruv

Vindberg

Försök på Linderöd.

Koordinater X:

Y:

Led Behandling	Dos	Mängd/ha
A. Obehandlat		
B. Obehandlat		
C. Bacara	1/2	0,5 l
D. Bacara	1/1	1,0 l
E. Bacara	2/1	2,0 l
F. Boxer	1/2	1,0 l
G. Boxer	1/1	2,0 l
H. Boxer	2/1	4,0 l
I. Lexus 50 WG	1/2	10 g
J. Lexus 50 WG	1/1	20 g
K. Lexus 50 WG	2/1	40 g
L. Bacara+Boxer+Lexus 50 WG	1/2	0,1 l + 0,5 l + 5 g
M. Bacara+Boxer+Lexus 50 WG	1/1	0,2 l + 1,0 l + 10 g
N. Bacara+Boxer+Lexus 50 WG	2/2	0,4 l + 2,0 l + 20 g

Grödan ska ha 1,5-2 blad vid behandling

Karta över försöksfältet:

Block IV
LFBHDHJMCGLAEKBlock V
NGJAFDMIKBHCELBlock VI
IGADFNHLHBJCKMEBlock I
GNLCAEJFMBKDHIBlock II
MHALKDGFJFCINBEBlock III
JMEDICHLGLFKNAx 6426 310
y 1461 690

Försöket ligger ca m i riktning från

Norrpil o Plöjningsriktning o

Allmänna uppgifter/anvisningar

Bruttoyta: X = m²

3,0 12,0

Nettoyta: X = m²

Förfrukt: Sädd:

Ärter

Sort:

Olin

Behandling:

Höst 5/10-26 SÄR/FL

Väderdata registreras enligt PM.

Jordprov (general) stora kartongen ca 1 kg
insändes till AnalyCen, Estrids väg 1,
291 65 Kristianstad

Graderingar och bestämmningar:

BEHANDLINGSSKADOR graderas 1-2 veckor
efter behandling.BESTÅND och BEHANDLINGSSKADA graderas före
invintring.BESTÅND vid tillväxtstart på våren och ev.
gulfärgning och ev. nekroser graderas.

OGRÄSRÄKNING enl. GEP-standard, rutvis.

Stråstyrka vid skörd rutvis.

RUTVIS prov enligt standardrutin (backar)
Inväges och torkas före inskick.Skickas till: Agrilab. eller Hushållnings-
sällskapet, Försöksavd. Järnvägsgatan 18,
532 22 Skara

Kontaktperson beställare: Ingemar Gruvæus 0511-248 31 ingemar.gruvæus@hs-r.hush.se

Sprutjournal (bilaga, ogräsförsök)

Adnr: f35516

Plannr: 25-24P

Försöksnr: E190-2006

	Spruttilfälle					
	1	2	3	4	5	6
Sprutning utförd av (signatur)	Sofia / FC					
Datum (år, mån, dag)	061005					
Tid på dagen	1030-1230					
Grödans utveckling (decimalskalan)	12					
Grödans täthet (gles, normal, tät)	normal					
Ogräsens utveckling	Högräskl					
Ogräsbestånd (glost, normalt, tät)	glost					
Tillväxthastighet, (låg, normal, hög) *	normal-Hög					
Temperatur, °C (30 cm ovan mark)	14,3					
Rel. fuktighet, % (30 cm ovan mark)	74,2					
Markfuktighet (våt, normal, torr)	Fuktig-våt					
Molnighet, %	60					
Vindhastighet i ramphöjd, m/s	2,6					
Vindriktning över rutorna (längs, tvärs, diagonal)	längs					
Dagg (mycket, måttlig, ingen)	ingen					
Förekomst av frost eller torka	ingen					
Regnfri tid efter behandling						
Spridare, typ	LD 02-110					
Övrigt (avvikelser och problem)						

* Tillväxthastighet vanligen hög vid hög temperatur och god markfuktighet under längre tid, låg vid kallt väder och torka