

**FÄLTKORT 2007 L5-247-06V****E-149-2006****F35526****Hushållningssällskapet****Försöksserie: Selektivitet för gräsherbicider i höstvet****Försöksvärd: Anders Granet****Adress: Vinberg, Gädd Motala****Koordinater X:****Led Behandling**

A. Obehandlat

B. Obehandlat

C. Bacara

1/2 0,5 l

D. Bacara

1/1 1,0 l

E. Bacara

2/1 2,0 l

F. Boxer

1/2 1,0 l

G. Boxer

1/1 2,0 l

H. Boxer

2/1 4,0 l

I. Lexus 50 WG

1/2 10 g

J. Lexus 50 WG

1/1 20 g

K. Lexus 50 WG

2/1 40 g

L. Bacara+Boxer+Lexus 50 WG

1/2 0,1 l + 0,5 l + 5 g

M. Bacara+Boxer+Lexus 50 WG

1/1 0,2 l + 1,0 l + 10 g

N. Bacara+Boxer+Lexus 50 WG

2/2 0,4 l + 2,0 l + 20 g

Grödan ska ha 1,5-2 blad vid behandling

Karta över försöksfältet:

Block IV

MFKBEAJDHICGLN

Block V

IHCNFKADEJMGBL

Block VI

MCGIKEAHNJDLBF

Block I


KHBGAJNCELIMDF

Block II

FCJDGKEINBLMHA

Block III

AGINDLFJHBMKEC



Försöket ligger ca m i riktning från

Nörripil o Plöjningsriktning o

Allmänna uppgifter/anvisningar

Bruttoyta: X = m²
3,0 12,0 36,0

Nettoyta: X = m²

Förfrukt: Sådd:

Sort: *Olivia*

Behandling:

06-10-03 AE-AT-MW

Väderdata registreras enligt PM.

Jordprov (general) stora kartongen ca 1 kg
insändes till AnalyCen, Estrids väg 1,
291 65 Kristianstad
06-10-03 AE

Graderingar och bestämningar:

BEHANDLINGSSKADOR graderas 1-2 veckor
efter behandling. 9/10-06 SAG

BESTÅND och BEHANDLINGSSKADA graderas före
invintring.

BESTÅND vid tillväxtstart på våren och ev.
gulfärgning och ev. nekroser graderas.

OGRÄSRÄKNING enl. GEP-standard, rutvis.

Stråstyrka vid skörd rutvis.

RUTVIS prov enligt standardrutin (backar)
Inväges och torkas före inskick.

Skickas till: Agrilab. eller Hushållnings-
sällskapet, Försöksavd. Järnvägsgatan 18,
532 22 Skara

Kontaktperson - beställare: Ingemar Gruväus 0511-248 31 ingemar.gruvaeus@hs-r.hush.se

Sprutjournal (bilaga, ogräsförsök)

Adbnr:	F35 526
Plannr:	L5 - 247 - 06
Försöksnr:	E-189 - 06

Spruttilfälle						
	1	2	3	4	5	6
Sprutning utförd av (signatur)	AE-AT - MW					
Datum (år, mån, dag)	06-10-03					
Tid på dagen	12.30 - 14.00					
Grödans utveckling (decimalskalan)	12					
Grödans täthet (gles, normal, tät)	normal					
Ogräsens utveckling	5 - 15					
Ogräsbestånd (gles, normalt, tät)	normalt					
Tillväxthastighet, (låg, normal, hög) *	hög					
Temperatur, °C (30 cm ovan mark)	15,5					
Rel. fuktighet, % (30 cm ovan mark)	80%					
Markfuktighet (våt, normal, torr)	normal					
Molnighet, %	75%					
Vindhastighet i ramphöjd, m/s	1.5					
Vindriktning över rutorna (längs, tvärs, diagonalt)	diagonalt					
Dagg (mycket, måttlig, ingen)	ingen					
Förekomst av frost eller torka	nej					
Regnfri tid efter behandling						
Spridare, typ	hardje 51 LD - 02-110					
Övrigt (avvikelser och problem)						

Tillväxthastighet vanligen hög vid hög temperatur och god markfuktighet under längre tid, låg vid kallt väder och torka