



FÄLT KORT

2004

L15-4040-04V

R-915-2004

F39154

Försök i Väst

Försöksserie: Referensförsök, maltkorn

Försöksvärd: Hushållningssällskapet

Adress: Hökatorp, Götene

Koordinater X: 6491,370

Y: 1370,367

Led

A. Obehandlad

B. 0,8 l Stratego

DC 37-39

C. 0,8 l Proline

DC 37-39

D. 0,4 l Stratego + 0,4 l Proline

DC 37-39

E. 1,0 kg Acanto Prima

DC 37-39

F. 0,5 l Amistar Duo

DC 37-39

G. 0,3 l Amistar Duo

DC 37-39

H. 0,8 l Tilt Top

DC 45-49

I. 0,25 l Comet + 0,25 l Sportak

DC 37-39

J. 0,5 l Comet Plus + 0,25 l Sportak

DC 37-39

K. 1,0 l Comet Plus + 0,5 l Sportak

DC 37-39

L. 0,75 l Opera

DC 37-39

M. 0,4 l Proline

DC 37-39

N. 0,4 l Stereo

DC 37-39

O. 0,4 l Tilt Top

DC 37-39

P. 0,8 l Tilt Top


DC 37-39

Insektsbekämpning utförs i hela försöket med pyretroid i DC 37-39

Ruttfördelning i fält

Block I-IV

IKODAJEGLCPBHMFN PNGLCAODFBEMHKJI BFJKNHLMCDIGAEOP HPOFMNIJGLCDEAKB



Försöket ligger ca 350 m i NO riktning från P

Norripil o Flöjn. riktn

Allmänna uppgifter/anvisningar

Bruttoyta: 4 X 12,50 =

Nettoyta: X =

Förfrukt: H-vete Förförfrukt:

Sort: Otira Sådd: 28 Mars

Jordprov, general, insänt:

Gödsling:

Behandling: I II

Utvecklingsstadium vid behandling:

I II

Fyll i separat sprutjournal!

Nederbördsprotokoll förs dygnsvis.

Graderingar och bestämningar

Anteckna verkligt utvecklingsstadium vid behandlingar och graderingar!

Utläggingsgradering enl. GEP-SF, ytgrad. i led A 25 blad/nivå i DC 37-39 + 45-49

PROVTAGNING: 25 strån per A-ruta DC 37-39 fryses för senare analys av bipolaris

Slutgradering, bladsvampar ca 3-4 veckor efter sista behandling.
Bladfläckar mm på blad 1-3 i alla led enl. NY RUTIN
A-led också ytgradering enl. gammal metod.

Rutvis skörd, rutvisa skördeprov.

Analys standard + protein + stärkelse. samt maltkornssortering utförs av HS, Skara

Kontaktperson - beställare: Ingemar Gruvaeus 0511-248 31

Kontaktperson - utförare: Per Ullberg 0511-248 80 0708, 261 886