

Led

A. Obehandlad	
B. 0,8 l Stratego	DC 37-39
C. 0,8 l Proline	DC 37-39
D. 0,4 l Stratego + 0,4 l Proline	DC 37-39
E. 1,0 kg Acanto Prima	DC 37-39
F. 0,5 l Amistar Duo	DC 37-39
G. 0,3 l Amistar Duo	DC 37-39
H. 0,8 l Tilt Top	DC 45-49
I. 0,25 l Comet + 0,25 l Sportak	DC 37-39
J. 0,5 l Comet Plus + 0,25 l Sportak	DC 37-39
K. 1,0 l Comet Plus + 0,5 l Sportak	DC 37-39
L. 0,75 l Opera	DC 37-39
M. 0,4 l Proline	DC 37-39
N. 0,4 l Stereo	DC 37-39
O. 0,4 l Tilt Top	DC 37-39
P. 0,8 l Tilt Top	DC 37-39


Insektsbekämpning utförs i hela försöket med pyretroid i DC 37-39

Rutfördelning i fält

Block I-IV

LJBPDAHKNCQEMGFI PEGLCMFDBAINHOJK FEHMGJDIANKCBOPL GINDBPLJCHAMEFOK

Pro-
gnos



I

II

III

IV

Gården
Försöket ligger ca 150 m i O riktning från P

Norrpil → Plöjn. rikt. ←

Allmänna uppgifter/anvisningar

Bruttoyta: 16,65 X 3 =

Nettoyta: X =

Förfrukt: Förförfrukt:

Sort: Sådd:

Jordprov, general, insänt:

Gödsling:

Behandling: I II

Utvecklingsstadium vid behandling:

I II

Fyll i separat sprutjournal!

Nederbördsprotokoll förs dygnsvis.

Graderingar och bestämningar

Anteckna verkligt utvecklingsstadium vid behandlingar och graderingar!

Utläggingsgradering enl. GEP-SF, ytgrad. i led A 25 blad/nivå i DC 37-39 + 45-49

PROVTAGNING: 25 strån per A-ruta DC 37-39 fryses för senare analys av bipolaris

Slutgradering, bladsvampar ca 3-4 veckor efter sista behandling.

Bladfläckar mm på blad 1-3 i alla led enl. NY RUTIN

A-led också ytgradering enl. gammal metod.

Rutvis skörd, rutvisa skördeprov.

Analys standard + protein + stärkelse. samt maltkornssortering utförs av HS, Skara

Kontaktperson - beställare: Ingemar Gruvaeus 0511-248 31

Kontaktperson - utförare: Per Ullberg 0511-248 80

0708-261886