



RESULTAT

Markvetenskap
Växtnäringslära

2001

OS3-924

U-103-2000

03B008

1

N-gödsling till timotejfrövall

Stefan Bertholtz
Gränsbo, Ransta

DATUM FÖR GRUNDGÖDSLING KG/HA N P K

GRÖDA: TIMOTEJFRÖVALL SÅDATUM:
SORT: GRINDSTAD FÖRFRUKT:

JORDART: mmr Styv lera

pH-värde: 5,7 P-HCl: Cu-HCl: 34,0
P-AL: 4,3 K-HCl: 235 B:
K-AL: 20,0 T: NEDERBÖRD GÖDSLING-SKÖRD, MM
Mg-AL: 33,0 S: MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP
Ca-AL: 250

S04-S 0-30 cm:

S04-S 30-60 cm:

MIN-N NO3-N NH4-N
0-60 CM H-00 8 9 KG/HA

F Ö R S Ö K S L E D:

FRÖ RENV. KG/HA	REL - TAL	1000 - KORN - VIKT G	ANTAL AX PER METER	MIN - N VÅR KG/HA 0-60	S04 - S VÅR MG/KG 0-30	S04 - S VÅR MG/KG 30-60							
08-17			07-24										
KG KVÄVE PER HEKTAR													
HÖST	VÅR, TIDIGT	VÅR, SENT											
A.	0	0	0	80	100	0,6	21	20	4,25	5,65			
B.	0	0	90	160	208	0,7	51	20	4,25	5,65			
C.	0	90	0	220	288	0,6	36	20	4,25	5,65			
D.	0	45	45	190	250	0,6	38	20	4,25	5,65			
E.	30	0	0	100	131	0,5	21	16	3,76	5,54			
F.	30	0	90	240	320	0,7	47	16	3,76	5,54			
G.	30	90	0	230	303	0,6	44	16	3,76	5,54			
H.	30	30	60	230	295	0,6	47	16	3,76	5,54			
I.	30	60	30	250	328	0,5	50	16	3,76	5,44			
-X-				190									
CV%				16,4									
OBS				27									
PROB F1				.0001									
LSD F1				50									

Gödslingstidpunkter: 09-21, 05-03, 05-23

ANSVARIG: Lennart Mattsson 2002-01-31