



RESULTAT

Markvetenskap
Växtnäringslära

2002

L3-0000

M-205-1959 03C021

1

Halm-kväve

Malmöhus Läns Hushållningssällskap
Borgeby, Bjärred

GRÖDA: HÖSTRAPS SÅDATUM: 2001-08-16 DATUM FÖR 2001-08-15 GRUNDGÖDSLING KG/HA N P K
SORT: CAPITOL FÖRFRUKT: KORN PK 11-21 200 22 42

JORDART: mmh Svagt lerig moränmo

pH-värde: 7,0

P-AL: 10,6

K-AL: 9,8

Mg-AL:

Ca-AL:

S04-S 0-30 cm:

S04-S 30-60 cm:

P-HCl:

K-HCl:

T:

S:

Cu-HCl:

B:

K/Mg:

NEDERBÖRD GÖDSLING-SKÖRD, MM

MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP

18 42 88 90

MIN-N

N03-N

NH4-N

KG/HA

F Ö R S Ö K S L E D :

	FRÖ RENV. KG/HA	REL- TAL	REL- TAL	AV- RENS- %	VATT. HALT VID SKÖRD	1000- KORN- VIKT G	PLANT TÄT- HET 0-100 03-25	STRÅ- STYR- KA 0-100 07-27	OGRÄS FÖREK 0-100 07-09							
HALMEN BORTFÖRES UTAN KVÄVE	1630	100	100	5,8	14,2	5,9	70	80	45							
UREA 31N HÖST+ 40N VÅR	1790	100	109	7,8	15,0	5,8	73	80	40							
UREA 31N HÖST+120N VÅR	1790	100	110	9,9	17,2	5,9	70	80	33							
KKV 31N HÖST+ 40N VÅR	1430	100	87	15,2	19,7	5,4	70	80	40							
KKV 31N HÖST+120N VÅR	1310	100	80	23,3	25,3	6,1	70	80	40							
KS 31N HÖST+ 40N VÅR	1750	100	107	7,7	16,7	5,7	70	80	40							
KS 31N HÖST+120N VÅR	750	100	46	34,4	22,1	6,2	70	80	38							
UREA 80N VÅR	1070	100	65	26,7	18,0	6,1	70	80	40							
KKV 80N VÅR	1440	100	88	11,2	15,1	5,5	70	80	40							
KS 80N VÅR	850	100	52	26,1	22,8	6,1	73	80	40							
HALMEN NEDPLÖJES UTAN KVÄVE	1390	85	100	8,0	14,9	5,6	70	80	43							
UREA 31N HÖST+ 40N VÅR	1590	89	114	8,5	18,3	5,5	70	80	40							
UREA 31N HÖST+120N VÅR	1270	71	91	16,6	23,7	5,7	73	80	38							
KKV 31N HÖST+ 40N VÅR	1470	103	106	10,9	22,2	5,4	70	80	40							
KKV 31N HÖST+120N VÅR	1280	98	92	12,1	21,0	5,6	75	80	30							
KS 31N HÖST+ 40N VÅR	1300	75	93	9,7	19,7	5,7	73	80	40							

Stor ogräsförekomst, osäker skörd.

ANSVARIG: Lennart Mattsson (2002-11-27)



RESULTAT

Markvetenskap
Växtnäringslära

2002

L3-0000

M-205-1959 03C021

2

Halm-kväve

Malmöhus Läns Hushållningssällskap
Borgeby, Bjärred

GRÖDA: HÖSTRAPS SÅDATUM: 2001-08-16 DATUM FÖR 2001-08-15 GRUNDGÖDSLING PK 11-21 KG/HA 200 N 22 P 42 K
SORT: CAPITOL FÖRFRUKT: KORN

JORDART: mmh Svagt lerig moränmo

pH-värde: 7,0

P-HCl:

Cu-HCl:

P-AL: 10,6

K-HCl:

B:

NEDERBÖRD GÖDSLING-SKÖRD, MM

K-AL: 9,8

T:

K/Mg:

MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP

Mg-AL:

S:

18 42 88 90

Ca-AL:

S04-S 0-30 cm:

MIN-N

NO3-N

NH4-N

S04-S 30-60 cm:

KG/HA

	FRÖ RENV. KG/HA	REL- TAL	REL- TAL	AV- RENS- %	VATT. HALT VID SKÖRD	1000- KORN- VIKT G	PLANT TÄT- HET 0-100 03-25	STRÅ- STYR- KA 0-100 07-27	OGRÄS FÖREK 0-100 07-09							
F Ö R S Ö K S L E D:	07-27															
KS 31N HÖST+120N VÅR	960	129	69	23,4	26,3	5,8	70	80	38							
UREA 80N VÅR	1460	137	105	8,9	17,8	5,2	75	80	40							
KKV 80N VÅR	1340	93	96	13,1	21,8	5,9	70	80	40							
KS 80N VÅR	780	92	56	27,7	34,2	5,9	70	80	35							
HALMEN BRÄNNES UTAN KVÄVE	1510	92	100	5,4	11,6	5,5	73	80	45							
UREA 31N HÖST+ 40N VÅR	1590	89	106	5,4	10,9	5,8	73	80	40							
UREA 31N HÖST+120N VÅR	1460	81	97	9,8	17,7	5,9	75	80	38							
KKV 31N HÖST+ 40N VÅR	1420	99	94	6,8	13,3	5,1	73	80	40							
KKV 31N HÖST+120N VÅR	1950	148	129	6,2	16,0	5,8	73	80	40							
KS 31N HÖST+ 40N VÅR	1700	97	113	5,4	12,7	5,7	75	80	40							
KS 31N HÖST+120N VÅR	590	79	39	36,8	40,3	6,1	70	80	35							
UREA 80N VÅR	1450	136	97	8,2	15,7	5,9	73	80	40							
KKV 80N VÅR	1600	111	106	5,7	12,1	6,0	73	80	40							
KS 80N VÅR	1370	162	91	8,4	16,2	5,5	73	80	40							

Stor ogräsförekomst, osäker skörd.

ANSVARIG: Lennart Mattsson (2002-11-27)



RESULTAT

Markvetenskap
Växtnäringslära

2002

L3-0000

M-205-1959 03C021

3

Halm-kväve

Malmöhus Läns Hushållningssällskap
Borgeby, Bjärred

GRÖDA: HÖSTRAPS SÅDATUM: 2001-08-16 DATUM FÖR 2001-08-15 GRUNDGÖDSLING KG/HA N P K
SORT: CAPITOL FÖRFRUKT: KORN PK 11-21 200 22 42

JORDART: mmh Svagt lerig moränmo

pH-värde: 7,0

P-AL: 10,6

K-AL: 9,8

Mg-AL:

Ca-AL:

S04-S 0-30 cm:

S04-S 30-60 cm:

P-HCl:

K-HCl:

T:

S:

Cu-HCl:

B:

K/Mg:

NEDERBÖRD GÖDSLING-SKÖRD, MM

MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP

18 42 88 90

MIN-N

NO3-N

NH4-N

KG/HA

	FRÖ RENV. KG/HA	REL- TAL	REL- TAL	AV- RENS- %	VATT. HALT VID SKÖRD	1000- KORN- VIKT G	PLANT TÄT- HET 0-100 03-25	STRÅ- STYR- KA 0-100 07-27	OGRÄS FÖREK 0-100 07-09							
F Ö R S Ö K S L E D :	07-27															
HALMEN BORTFÖRES	1380	100		16,8	18,6	5,9	71	80	40							
HALMEN NEDPLÖJES	1290	93		13,9	22,0	5,6	72	80	38							
HALMEN BRÄNNES	1460	106		9,8	16,6	5,7	73	80	40							
UTAN KVÄVE	1510		100	6,4	13,6	5,7	71	80	44							
UREA 31N HÖST + 40N VÅR	1650		110	7,2	14,7	5,7	72	80	40							
UREA 31N HÖST + 120N VÅR	1510		100	12,1	19,5	5,8	73	80	36							
KKV 31N HÖST + 40N VÅR	1440		95	11,0	18,4	5,3	71	80	40							
KKV 31N HÖST + 120N VÅR	1510		100	13,9	20,7	5,8	73	80	37							
KS 31N HÖST + 40N VÅR	1580		105	7,6	16,4	5,7	73	80	40							
KS 31N HÖST + 120N VÅR	770		51	31,6	29,6	6,0	70	80	37							
UREA 80N VÅR	1330		88	14,6	17,1	5,8	73	80	40							
KKV 80N VÅR	1460		97	10,0	16,3	5,8	71	80	40							
KS 80N VÅR	1000		66	20,7	24,4	5,8	72	80	38							

Stor ogräsförekomst, osäker skörd.

ANSVARIG: Lennart Mattsson (2002-11-27)



RESULTAT

Markvetenskap
Växtnäringslära

2002

L3-0000

M-205-1959 03C021

4

Halm-kväve

Malmöhus Läns Hushållningssällskap
Borgeby, Bjärred

GRÖDA: HÖSTRAPS SÅDATUM: 2001-08-16 DATUM FÖR 2001-08-15 GRUNDGÖDSLING KG/HA N P K
SORT: CAPITOL FÖRFRUKT: KORN PK 11-21 200 22 42

JORDART: mmh Svagt lerig moränmo

pH-värde: 7,0

P-HCl:

Cu-HCl:

P-AL: 10,6

K-HCl:

B:

NEDERBÖRD GÖDSLING-SKÖRD, MM

K-AL: 9,8

T:

K/Mg:

MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP

Mg-AL:

S:

18 42 88 90

Ca-AL:

S04-S 0-30 cm:

MIN-N

N03-N

NH4-N

S04-S 30-60 cm:

KG/HA

	FRÖ RENV. KG/HA	REL- TAL	REL- TAL	AV- RENS- %	VATT. HALT VID SKÖRD	1000- KORN- VIKT G	PLANT TÄT- HET 0-100 03-25	STRÅ- STYR- KA 0-100 07-27	OGRÄS FÖREK 0-100 07-09							
F Ö R S Ö K S L E D:	07-27															
-X-	1380															
CV%	15,8															
OBS	60															
PROB F1	.4418															
PROB F2	.0001															
PROB F1*F2	.0499															
LSD F2	260															
LSD F1*F2	470															

Stor ogräsförekomst, osäker skörd.

ANSVARIG: Lennart Mattsson (2002-11-27)