



RESULTAT

Markvetenskap
Växtnäringslära

2002

L3-2258B

ABC-1-2002 03C033

1

Kvävestrategi i höstvet i Mellansverige

HS Landsbygdskonsult AB
Fransåker, 195 92 Märsta

DATUM FÖR GRUNDGÖDSLING KG/HA N P K

GRÖDA: HÖSTVETE SÅDATUM: 2001-09-29
SORT: TARSO FÖRFRUKT: VÄRRAPS

JORDART: mf Mellanlera

pH-värde: 6,7 P-HCl: 98 Cu-HCl: 31,0

P-AL: 18,0 K-HCl: 444 B:

K-AL: 22,0 T: 17,4 K/Mg:

Mg-AL: 16,0 S: 12,9

Ca-AL: 220

S04-S 0-30 cm:

S04-S 30-60 cm:

NEDERBÖRD GÖDSLING-SKÖRD, MM

MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP

9 41 99 91

MIN-N NO3-N NH4-N
0-60 CM V-02 27 6 KG/HA

F Ö R S Ö K S L E D:

Led	20/3-10/4 Tidpunkt Tidig	10-25/4 Normal Före stråskj.	10-20/5 DC31	25/5-5/6 DC37	6-15/6 DC45	Tot. N-giva Kg/ha	KÄRNA RENV. KG/HA	REL - TAL F1	AV - RENS - %	VATT. HALT VID SKÖRD	RYMD - VIKT G/L	1000 - KORN - VIKT G	N % AV TS KÄRNA	FALL - TAL	PRO - TEIN % AV TS	N - SKÖRD KG/HA
							08-07									
A.						0	3430	100	0,4	14,6	829	43,0	1,63	400	9,29	48
B.	50	70				120	7560	220	0,4	14,4	832	44,3	1,86	400	10,60	112
C.		70	50			120	7550	220	0,3	15,4	835	45,4	1,89	440	10,77	121
D.	50	70			40	160	8320	243	0,4	13,2	838	45,4	2,07	440	11,80	146
E.		70	50		40	160	7860	229	0,5	14,3	837	44,8	2,19	430	12,48	146
F.		120				120	7690	224	0,4	14,3	829	41,8	1,91	430	10,89	125
G.		120		40		160	8260	241	0,6	14,3	836	44,8	2,11	430	12,03	148
H.	50	70	40	40		200	8610	251	0,9	14,2	839	43,2	2,25	430	12,83	165
I.	50	30				80	6670	194	1,1	14,3	834	44,1	1,65	400	9,41	93
J.	50	110				160	8280	241	0,9	14,5	835	41,1	2,02	420	11,51	142
K.	50	70		40		160	8140	237	1,1	14,3	833	43,2	2,09	450	11,91	145
L.	50	110		40		200	8580	250	1,2	14,4	834	42,2	2,21	430	12,60	161

Beh. med Stereo: 05-22

Beh. med Amistar: 06-06

ANSVARIG: Ingemar Gruvaeus (2002-11-18)



RESULTAT

Markvetenskap
Växtnäringslära

2002

L3-2258B

ABC-1-2002 03C033

2

Kvävestrategi i höstvet i Mellansverige

HS Landsbygdskonsult AB
Fransåker, 195 92 Märsta

DATUM FÖR GRUNDGÖDSLING KG/HA N P K

GRÖDA: HÖSTVETE SÅDATUM: 2001-09-29
SORT: TARSO FÖRFRUKT: VÄRRAPS

JORDART: mf Mellanlera

pH-värde: 6,7 P-HCl: 98 Cu-HCl: 31,0

P-AL: 18,0 K-HCl: 444 B:

K-AL: 22,0 T: 17,4 K/Mg:

Mg-AL: 16,0 S: 12,9

Ca-AL: 220

S04-S 0-30 cm:

S04-S 30-60 cm:

NEDERBÖRD GÖDSLING-SKÖRD, MM

MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP

9 41 99 91

MIN-N NO3-N NH4-N
0-60 CM V-02 27 6 KG/HA

F Ö R S Ö K S L E D:

Led	20/3-10/4	10-25/4	10-20/5	25/5-5/6	6/6-15/6	Tot. N-giva Kg/ha	KÄRNA RENV. KG/HA	REL - TAL F1	AV- RENS- %	VATT. HALT VID SKÖRD	RYMD- VIKT G/L	1000- KORN- VIKT G	N % AV TS KÄRNA	FALL- TAL	PRO- TEIN % AV TS	N- SKÖRD KG/HA
	Tidpunkt Tidig	Normal Före stråskj.	DC31	DC37	DC45		08-07									
M.		160		40		200	8330	243	1,9	14,4	839	48,7	2,25	410	12,83	159
N.	90	110				200	8630	252	0,8	14,4	835	42,3	2,19	400	12,48	161
O.	90	110		40		240	8670	253	0,8	14,3	836	44,2	2,30	420	13,11	170
P.	50	110			40	200	8600	251	1,2	14,2	837	45,3	2,21	430	12,60	162
-X-							7820									
CV%							3,7									
OBS							64									
PROB F1							.0001									
LSD F1							410									

Beh. med Stereo: 05-22

Beh. med Amistar: 06-06

ANSVARIG: Ingemar Gruvaeus (2002-11-18)



RESULTAT

Markvetenskap
Växtnäringslära

2002

L3-2258B

ABC-1-2002 03C033

3

Kvävestrategi i höstvet i Mellansverige

HS Landsbygdskonsult AB
Fransåker, 195 92 Märsta

DATUM FÖR GRUNDGÖDSLING KG/HA N P K

GRÖDA: HÖSTVETE SÅDATUM: 2001-09-29
SORT: TARSO FÖRFRUKT: VÄRRAPS

JORDART: mf Mellanlera

pH-värde: 6,7	P-HCl: 98	Cu-HCl: 31,0
P-AL: 18,0	K-HCl: 444	B:
K-AL: 22,0	T: 17,4	K/Mg:
Mg-AL: 16,0	S: 12,9	
Ca-AL: 220		

NEDERBÖRD GÖDSLING-SKÖRD, MM
MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP
9 41 99 91

	MIN-N	NO3-N	NH4-N	
	0-60 CM	V-02	27	6 KG/HA

F Ö R S Ö K S L E D:

Led	20/3-10/4	10-25/4	10-20/5	25/5-5/6	6-15/6	Tot. N-giva Kg/ha	STRÅ- STYR- KA 0-100 08-07	ANTAL SKOTT PER M ² 05-08	ANTAL AX PER M ² 06-24	KS-MÅ TARE DC37 05-28	KS-MÅ TARE DC45 06-04	KS-MÅ TARE DC57 06-12				
Tidpunkt Normal Tidig	Före	stråskj.	DC31	DC37	DC45											
A.						0	100	683	189	377	338	430				
B.	50	70				120	100	832	264	613	624	594				
C.		70	50			120	100		251							
D.	50	70			40	160	100		255							
E.		70	50		40	160	100		274							
F.		120				120	100		243	632	646	608				
G.		120		40		160	100		260							
H.	50	70	40	40		200	100		289							
I.	50	30				80	100		224	574	531	561				
J.	50	110				160	100		270	689	661	614				
K.	50	70		40		160	100		253			622				
L.	50	110		40		200	100		247			635				

Beh. med Stereo: 05-22

Beh. med Amistar: 06-06

ANSVARIG: Ingemar Gruvaeus (2002-11-18)



RESULTAT

Markvetenskap
Växtnäringslära

2002

L3-2258B

ABC-1-2002 03C033

4

Kvävestrategi i höstvet i Mellansverige

HS Landsbygdskonsult AB
Fransåker, 195 92 Märsta

DATUM FÖR GRUNDGÖDSLING KG/HA N P K

GRÖDA: HÖSTVETE SÅDATUM: 2001-09-29
SORT: TARSO FÖRFRUKT: VÄRRAPS

JORDART: mf Mellanlera

pH-värde: 6,7 P-HCl: 98 Cu-HCl: 31,0
P-AL: 18,0 K-HCl: 444 B:
K-AL: 22,0 T: 17,4 K/Mg:
Mg-AL: 16,0 S: 12,9

NEDERBÖRD GÖDSLING-SKÖRD, MM
MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP
9 41 99 91

S04-S 0-30 cm: MIN-N N03-N NH4-N
S04-S 30-60 cm: 0-60 CM V-02 27 6 KG/HA

F Ö R S Ö K S L E D:

Led	20/3-10/4	10-25/4	10-20/5	25/5-5/6	6/6-15/6	Tot. N-giva Kg/ha
Tidpunkt	Normal					
Tidig	Före stråskj.	DC31	DC37	DC45		
M.		160		40		200
N.	90	110				200
O.	90	110	40			240
P.	50	110			40	200

-X-
CV%
OBS
PROB F1
LSD F1

STRÅ- STYR- KA 0-100 08-07	ANTAL SKOTT PER M ² 05-08	ANTAL AX PER M ² 06-24	KS-MÄ TARE DC37 05-28	KS-MÄ TARE DC45 06-04	KS-MÄ TARE DC57 06-12				
100	813	267	700	657	645				
100		269	706	681	641				
100		262			679				
100		254							

Beh. med Stereo: 05-22
Beh. med Amistar: 06-06

ANSVARIG: Ingemar Gruvaeus (2002-11-18)