



RESULTAT

Markvetenskap
Växtnäringslära

2002

L3-2258B

D-1-2002

03C034

1

Kvävestrategi i höstvet i Mellansverige

Jens Persson
Solö Fogdö, Strängnäs

DATUM FÖR GRUNDGÖDSLING KG/HA N P K

GRÖDA: HÖSTVETE SÅDATUM: 2001-09-23
SORT: TARSO FÖRFRUKT: KORN

JORDART:

pH-värde:

P-AL:

K-AL:

Mg-AL:

Ca-AL: 110

S04-S 0-30 cm:

S04-S 30-60 cm:

P-HCl:

K-HCl:

T:

S:

Cu-HCl:

B:

K/Mg:

NEDERBÖRD GÖDSLING-SKÖRD, MM

MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP

15 15 42 110 145

MIN-N NO3-N NH4-N
0-60 CM V-02 29 14 KG/HA

F Ö R S Ö K S L E D:

Led	20/3-10/4 Tidpunkt Tidig	10-25/4 Normal Före stråskj.	10-20/5 DC31	25/5-5/6 DC37	6-15/6 DC45	Tot. N-giva Kg/ha	KÄRNA RENV. KG/HA	REL - TAL F1	AV- RENS- %	VATT. HALT VID SKÖRD	RYMD- VIKT G/L	1000- KORN- VIKT G	N % AV TS KÄRNA	FALL- TAL	PRO- TEIN % AV TS	N- SKÖRD KG/HA
							08-03									
A.						0	4780	100	0,9	15,8	787	41,7	1,88	420	10,72	76
B.	50	70				120	7900	165	0,5	15,7	793	43,7	2,00	410	11,40	126
C.		70	50			120	8180	171	0,5	13,7	798	41,9	2,14	410	12,20	149
D.	50	70			40	160	8260	173	0,5	13,2	801	45,1	2,18	400	12,43	153
E.		70	50		40	160	7990	167	0,5	15,8	797	42,9	2,25	430	12,83	153
F.		120				120	8070	169	0,7	13,2	795	41,4	2,07	450	11,80	142
G.		120		40		160	8210	172	0,6	16,1	801	41,5	2,21	460	12,60	154
H.	50	70	40	40		200	8250	172	0,6	16,0	803	42,4	2,28	450	13,00	160
I.	50	30				80	7480	156	0,6	13,4	788	41,2	1,86	400	10,60	118
J.	50	110				160	8010	168	0,6	16,1	795	41,7	2,09	420	11,91	142
K.	50	70		40		160	8200	171	0,5	15,5	795	43,6	2,16	430	12,31	150
L.	50	110		40		200	8420	176	0,5	15,1	803	40,4	2,28	430	13,00	163

Beh. med Stereo: 05-20

Beh. med Amistar: 06-07

ANSVARIG: Ingemar Gruvaeus (2002-12-10)



RESULTAT

Markvetenskap
Växtnäringslära

2002

L3-2258B

D-1-2002

03C034

2

Kvävestrategi i höstvet i Mellansverige

Jens Persson
Solö Fogdö, Strängnäs

DATUM FÖR GRUNDGÖDSLING KG/HA N P K

GRÖDA: HÖSTVETE SÅDATUM: 2001-09-23
SORT: TARSO FÖRFRUKT: KORN

JORDART:

pH-värde:

P-AL:

K-AL:

Mg-AL:

Ca-AL: 110

S04-S 0-30 cm:

S04-S 30-60 cm:

P-HCl:

K-HCl:

T:

S:

Cu-HCl:

B:

K/Mg:

NEDERBÖRD GÖDSLING-SKÖRD, MM

MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP

15 15 42 110 145

MIN-N NO3-N NH4-N
0-60 CM V-02 29 14 KG/HA

F Ö R S Ö K S L E D:

Led	20/3-10/4	10-25/4	10-20/5	25/5-5/6	6/6-15/6	Tot. N-giva Kg/ha	KÄRNA RENV. KG/HA	REL - TAL F1	AV- RENS- %	VATT. HALT VID SKÖRD	RYMD- VIKT G/L	1000- KORN- VIKT G	N % AV TS KÄRNA	FALL- TAL	PRO- TEIN % AV TS	N- SKÖRD KG/HA
	Tidpunkt	Normal					08-03									
	Tidig	Före stråskj.	DC31	DC37	DC45											
M.		160		40		200	8440	176	0,5	15,2	799	43,1	2,26	440	12,88	162
N.	90	110				200	8360	175	0,6	15,2	797	42,5	2,25	430	12,83	160
O.	90	110		40		240	8440	176	0,6	15,1	802	42,7	2,32	380	13,22	166
P.	50	110			40	200	8320	174	0,4	15,2	798	43,1	2,26	430	12,88	160
-X-							7960									
CV%							2,6									
OBS							64									
PROB F1							.0001									
LSD F1							300									

Beh. med Stereo: 05-20

Beh. med Amistar: 06-07

ANSVARIG: Ingemar Gruvaeus (2002-12-10)



RESULTAT

Markvetenskap
Växtnäringslära

2002

L3-2258B

D-1-2002

03C034

3

Kvävestrategi i höstvet i Mellansverige

Jens Persson
Solö Fogdö, Strängnäs

DATUM FÖR GRUNDGÖDSLING KG/HA N P K

GRÖDA: HÖSTVETE SÅDATUM: 2001-09-23
SORT: TARSO FÖRFRUKT: KORN

JORDART:

pH-värde:

P-AL:

K-AL:

Mg-AL:

Ca-AL: 110

S04-S 0-30 cm:

S04-S 30-60 cm:

P-HCl:

K-HCl:

T:

S:

Cu-HCl:

B:

K/Mg:

NEDERBÖRD GÖDSLING-SKÖRD, MM

MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP

15 15 42 110 145

MIN-N

NO3-N

NH4-N

0-60 CM V-02

29

14

KG/HA

F Ö R S Ö K S L E D:

Led	20/3-10/4 Tidpunkt Tidig	10-25/4 Normal Före stråskj.	10-20/5 DC31	25/5-5/6 DC37	6-15/6 DC45	Tot. N-giva Kg/ha	STRÅ- STYR- KA 0-100 08-03	ANTAL SKOTT PER METER 04-04	ANTAL SKOTT PER METER 05-20	ANTAL AX PER METER 07-15	KS-MÄ TARE DC37 05-24	KS-MÄ TARE DC45 06-05				
A.						0	100	96	115	83	462	555				
B.	50	70				120	100		168	97	656	657				
C.		70	50			120	100			98		463				
D.	50	70			40	160	100			102		472				
E.		70	50		40	160	100			99		485				
F.		120				120	100			96	688	682				
G.		120		40		160	100			99		503				
H.	50	70	40	40		200	100			98		523				
I.	50	30				80	100			100	634	646				
J.	50	110				160	100			99	681	690				
K.	50	70		40		160	100			98		511				
L.	50	110		40		200	100			104		510				

Beh. med Stereo: 05-20

Beh. med Amistar: 06-07

ANSVARIG: Ingemar Gruvaeus (2002-12-10)



RESULTAT

Markvetenskap
Växtnäringslära

2002

L3-2258B

D-1-2002

03C034

4

Kvävestrategi i höstvet i Mellansverige

Jens Persson
Solö Fogdö, Strängnäs

DATUM FÖR GRUNDGÖDSLING KG/HA N P K

GRÖDA: HÖSTVETE SÅDATUM: 2001-09-23
SORT: TARSO FÖRFRUKT: KORN

JORDART:

pH-värde:

P-AL:

K-AL:

Mg-AL:

Ca-AL: 110

S04-S 0-30 cm:

S04-S 30-60 cm:

P-HCl:

K-HCl:

T:

S:

Cu-HCl:

B:

K/Mg:

NEDERBÖRD GÖDSLING-SKÖRD, MM

MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP

15 15 42 110 145

MIN-N

NO3-N

NH4-N

0-60 CM V-02

29

14

KG/HA

F Ö R S Ö K S L E D:

Led	20/3-10/4	10-25/4	10-20/5	25/5-5/6	6/6-15/6	Tot. N-giva Kg/ha
Tidpunkt	Normal					
Tidig	Före stråskj.	DC31	DC37	DC45		
M.		160		40		200
N.	90	110				200
O.	90	110	40			240
P.	50	110			40	200

-X-
CV%
OBS
PROB F1
LSD F1

STRÅ- STYR- KA 0-100 08-03	ANTAL SKOTT PER METER 04-04	ANTAL SKOTT PER METER 05-20	ANTAL AX PER METER 07-15	KS-MÄ TARE DC37 05-24	KS-MÄ TARE DC45 06-05				
100			103	690	690				
100		182	97	702	693				
100			101						
100			99		523				

Beh. med Stereo: 05-20

Beh. med Amistar: 06-07

ANSVARIG: Ingemar Gruvaeus (2002-12-10)