



RESULTAT

Markvetenskap
Växtnäringslära

2002

L3-2258B

U-1-2002

03C038

1

Kvävestrategi i höstvet i Mellansverige

Hushållningssällskapet
Brunnby Gård, 725 97 Västerås

DATUM FÖR GRUNDGÖDSLING KG/HA N P K

GRÖDA: HÖSTVETE SÅDATUM: 2001-09-13
SORT: TARSO FÖRFRUKT: EU-TRÄDA

JORDART: mmh Mjälalättlera

pH-värde: P-HCl:

P-AL: K-HCl:

K-AL: T:

Mg-AL: S:

Ca-AL:

S04-S 0-30 cm:

S04-S 30-60 cm:

Cu-HCl:

B:

K/Mg:

NEDERBÖRD GÖDSLING-SKÖRD, MM

MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP

S04-S 0-30 cm: S04-S 30-60 cm:							MIN-N		NO3-N		NH4-N					
							0-60 CM		V-02		24		9		KG/HA	
							KÄRNA RENV. KG/HA	REL- TAL F1	AV- RENS- %	VATT. HALT VID SKÖRD	RYMD- VIKT G/L	1000- KORN- VIKT G	N % AV TS KÄRNA	FALL- TAL	PRO- TEIN % AV TS	N- SKÖRD KG/HA
F Ö R S Ö K S L E D:							08-02									
Led	20/3-10/4 Tidpunkt Tidig	10-25/4 Normal Före stråskj.	10-20/5 DC31	25/5-5/6 DC37	6-15/6 DC45	Tot. N-giva Kg/ha										
A.						0	4190	100	0,4	16,8	808	40,6	1,74	380	9,92	62
B.	50	70				120	7070	169	0,3	16,8	823	43,2	1,96	400	11,17	118
C.		70	50			120	7430	177	0,3	16,8	823	41,6	2,12	410	12,08	134
D.	50	70			40	160	7430	177	0,4	17,0	823	44,5	2,18	390	12,43	138
E.		70	50		40	160	7550	180	0,4	17,1	826	42,5	2,26	360	12,88	145
F.		120				120	7190	172	0,2	16,9	823	41,7	1,98	430	11,29	121
G.		120		40		160	7410	177	0,4	16,9	824	43,5	2,21	450	12,60	139
H.	50	70	40	40		200	7830	187	0,3	17,4	823	43,4	2,25	420	12,83	150
I.	50	30				80	6540	156	0,4	16,7	820	41,2	1,77	410	10,09	98
J.	50	110				160	7360	176	0,4	16,9	818	42,6	2,05	410	11,69	128
K.	50	70		40		160	7500	179	0,3	17,0	821	42,5	2,16	410	12,31	138
L.	50	110		40		200	7650	183	0,3	17,2	824	42,7	2,21	380	12,60	144

Beh. med Stereo: 05-24

Beh. med Amistar: 06-17

ANSVARIG: Ingemar Gruvaeus (2002-11-08)



RESULTAT

Markvetenskap
Växtnäringslära

2002

L3-2258B

U-1-2002

03C038

2

Kvävestrategi i höstvet i Mellansverige

Hushållningssällskapet
Brunnby Gård, 725 97 Västerås

DATUM FÖR GRUNDGÖDSLING KG/HA N P K

GRÖDA: HÖSTVETE SÅDATUM: 2001-09-13
SORT: TARSO FÖRFRUKT: EU-TRÄDA

JORDART: mmh Mjälalättlera

pH-värde: P-HCl:

P-AL: K-HCl:

K-AL: T:

Mg-AL: S:

Ca-AL:

S04-S 0-30 cm:

S04-S 30-60 cm:

Cu-HCl:

B:

K/Mg:

NEDERBÖRD GÖDSLING-SKÖRD, MM

MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP

S04-S 0-30 cm: S04-S 30-60 cm:							MIN-N		N03-N		NH4-N					
							0-60 CM V-02		24		9 KG/HA					
							KÄRNA RENV. KG/HA	REL- TAL F1	AV- RENS- %	VATT. HALT VID SKÖRD	RYMD- VIKT G/L	1000- KORN- VIKT G	N % AV TS KÄRNA	FALL- TAL	PRO- TEIN % AV TS	N- SKÖRD KG/HA
F Ö R S Ö K S L E D:							08-02									
Led	20/3-10/4 Tidpunkt Tidig	10-25/4 Normal Före stråskj.	10-20/5 DC31	25/5-5/6 DC37	6/6-15/6 DC45	Tot. N-giva Kg/ha										
M.		160		40		200	7690	184	0,3	17,4	822	43,9	2,26	430	12,88	148
N.	90	110				200	7750	185	0,3	17,4	819	41,5	2,21	410	12,60	146
O.	90	110		40		240	7980	191	0,3	17,5	824	42,9	2,30	450	13,11	156
P.	50	110			40	200	7710	184	0,3	17,3	824	44,4	2,23	430	12,71	146
-X- CV%							7270									
OBS							3,2									
PROB F1							64									
LSD F1							.0001									
							330									

Beh. med Stereo: 05-24

Beh. med Amistar: 06-17

ANSVARIG: Ingemar Gruvaeus (2002-11-08)



RESULTAT

Markvetenskap
Växtnäringslära

2002

L3-2258B

U-1-2002

03C038

3

Kvävestrategi i höstvet i Mellansverige

Hushållningssällskapet
Brunnby Gård, 725 97 Västerås

DATUM FÖR GRUNDGÖDSLING KG/HA N P K

GRÖDA: HÖSTVETE SÅDATUM: 2001-09-13
SORT: TARSO FÖRFRUKT: EU-TRÄDA

JORDART: mmh Mjälalättlera

pH-värde: P-HCl:

P-AL: K-HCl:

K-AL: T:

Mg-AL: S:

Ca-AL:

S04-S 0-30 cm:

S04-S 30-60 cm:

Cu-HCl:

B:

K/Mg:

NEDERBÖRD GÖDSLING-SKÖRD, MM

MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP

MIN-N NO3-N NH4-N
0-60 CM V-02 24 9 KG/HA

F Ö R S Ö K S L E D:

Led	20/3-10/4 Tidpunkt Tidig	10-25/4 Normal Före stråskj.	10-20/5 DC31	25/5-5/6 DC37	6-15/6 DC45	Tot. N-giva Kg/ha	FALL- TAL	MIN-N E.SK KG/HA 0-60	STRÅ- STYR- KA 0-100 08-02	ANTAL SKOTT PER METER 04-09	ANTAL SKOTT PER METER 05-03	ANTAL AX PER METER 07-31	KS-MÅ TARE DC37 05-28	KS-MÅ TARE DC45 06-03	KS-MÅ TARE DC57 06-03
A.						0	380	11	100	126	139	42	501	505	519
B.	50	70				120	400	11	100		161	58	662	663	667
C.		70	50			120	410		100			56			
D.	50	70			40	160	390		100			56			
E.		70	50		40	160	360		100			57			
F.		120				120	430		100			54	674	661	671
G.		120		40		160	450		100			56			
H.	50	70	40	40		200	420		100			63			
I.	50	30				80	410		100			56	629	616	632
J.	50	110				160	410	8	100			56	702	682	678
K.	50	70		40		160	410	9	100			55			671
L.	50	110		40		200	380	11	100			51			693

Beh. med Stereo: 05-24

Beh. med Amistar: 06-17

ANSVARIG: Ingemar Gruvaeus (2002-11-08)



RESULTAT

Markvetenskap
Växtnäringslära

2002

L3-2258B

U-1-2002

03C038

4

Kvävestrategi i höstvet i Mellansverige

Hushållningssällskapet
Brunnby Gård, 725 97 Västerås

DATUM FÖR GRUNDGÖDSLING KG/HA N P K

GRÖDA: HÖSTVETE SÅDATUM: 2001-09-13
SORT: TARSO FÖRFRUKT: EU-TRÄDA

JORDART: mmh Mjälalättlera

pH-värde: P-HCl:

P-AL: K-HCl:

K-AL: T:

Mg-AL: S:

Ca-AL:

S04-S 0-30 cm:

S04-S 30-60 cm:

Cu-HCl:

B:

K/Mg:

NEDERBÖRD GÖDSLING-SKÖRD, MM

MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP

MIN-N NO3-N NH4-N
0-60 CM V-02 24 9 KG/HA

F Ö R S Ö K S L E D:

Led	20/3-10/4	10-25/4	10-20/5	25/5-5/6	6/6-15/6	Tot. N-giva Kg/ha	FALL- TAL	MIN-N E.SK KG/HA 0-60	STRÅ- STYR- KA 0-100 08-02	ANTAL SKOTT PER METER 04-09	ANTAL SKOTT PER METER 05-03	ANTAL AX PER METER 07-31	KS-MÅ TARE DC37 05-28	KS-MÅ TARE DC45 06-03	KS-MÅ TARE DC57 06-03
Tidpunkt	Normal														
Tidig	Före stråskj.	DC31	DC37	DC45											
M.		160		40		200	430		100			55	680	692	701
N.	90	110				200	410		100		154	59	711	695	700
O.	90	110		40		240	450	15	100			52			715
P.	50	110			40	200	430		100			56			
-X-															
CV%															
OBS															
PROB F1															
LSD F1															

Beh. med Stereo: 05-24

Beh. med Amistar: 06-17

ANSVARIG: Ingemar Gruvaeus (2002-11-08)