



RESULTAT

Markvetenskap
Växtnäringslära

2002

R3-3088

R-313-2002

03C053

1

P-dragering av utsädet i vårkorn

Curt Svensson
Vipetomten, Saleby

DATUM FÖR

GRUNDGÖDSLING

KG/HA

N P K

GRÖDA: VÅRKORN
SORT: OTIRA

SÅDATUM: 2002-04-02
FÖRFRUKT: HÖSTVETE

AXAN N27

407

110

JORDART: nmh Lerig mjäla

pH-värde: 6,4

P-HCl: 44

Cu-HCl:

P-AL: 2,7

K-HCl: 130

B:

NEDERBÖRD GÖDSLING-SKÖRD, MM

K-AL: 5,5

T:

K/Mg:

MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP

Mg-AL: 10,9

S:

Ca-AL: 182

S04-S 0-30 cm:

MIN-N

NO3-N

NH4-N

S04-S 30-60 cm:

KG/HA

F Ö R S Ö K S L E D:

A. Standard utsäde, utan P
B. Standard utsäde, 10 P i P20 radm. vid sådd
C. Standard utsäde, 5 P i P20 radm. vid sådd
D. iSeed, utan P
E. iSeed, 10 P i P20 radm. vid sådd
F. iSeed, 5 P i P20 radm. vid sådd

-X-
CV%
OBS
PROB F1
LSD F1

KÄRNA RENV. KG/HA	REL - TAL	AV - RENS - %	VATT. HALT VID SKÖRD	RYMD - VIKT G/L	1000 - KORN - VIKT G	P % AV TS KÄRNA							
08-06													
5630	100	3,1	15,7	639	47,4	0,32							
6520	116	2,7	15,5	651	50,4	0,31							
6080	108	2,9	15,4	637	47,5	0,31							
5650	100	2,4	16,5	643	48,3	0,30							
6320	112	2,5	16,1	645	49,2	0,31							
5950	106	3,8	16,3	643	51,1	0,32							
6030													
2													
24													
.0001													
170													

ANSVARIG: Lennart Mattsson 2003-05-03