



RESULTAT

Markvetenskap
Växtnäringslära

2002

L3-2259

M-712-2002 03C059

1

Etablering av fånggröda i höstvete

Göran Svensson
Wideröra gård, Vallåkra

DATUM FÖR GRUNDGÖDSLING KG/HA N P K

GRÖDA: HÖSTVETE SÅDATUM: 2001-09-20
SORT: RITMO FÖRFRUKT: HAVRE

JORDART: mf Lerig mo

pH-värde: 6,6

P-AL: 15,0

K-AL: 12,0

Mg-AL:

Ca-AL:

S04-S 0-30 cm:

S04-S 30-60 cm:

P-HCl:

K-HCl:

T:

S:

Cu-HCl:

B:

K/Mg:

NEDERBÖRD GÖDSLING-SKÖRD, MM

MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP

16 47 52 119 52

MIN-N

NO3-N

NH4-N

KG/HA

F Ö R S Ö K S L E D:

		KÄRNA RENV. KG/HA	REL - TAL	AV- RENS- %	VATT. HALT VID SKÖRD	PLANT TÄT- HET 0-100	STRÅ- STYR- KA 0-100	TS KG/HA KLÖ- VER 10-21	TS KG/HA GRÄS 10-21	TS KG/HA VIT- SENAP 10-21	TS KG/HA OLJE- RÄTTIKRIGT 10-21	TS KG/HA ÖV- 10-21	MARK- TÄCKN FGR 0-100	08-20
Insåningstidpunkt		09-03				03-26	08-19	10-21	10-21	10-21	10-21	10-21		
A. Utan fånggröda		9890	100	0,7	14,2	100	100						490	
B. Engelskt rajgräs, Tove (tidig)	Slutet av mars	9930	100	0,7	14,1	100	100	60	300				280	4
C. Engelskt rajgräs, Condesa (sen)	Slutet av mars	10080	102	0,8	14,0	100	100	80	360				190	4
D. Rödsvingel, Rubin	Slutet av mars	9930	100	0,6	14,3	100	100	50	400				200	4
E. Engelskt rajgräs, Tove (tidig)	15/6-1/7	9920	100	0,5	14,3	100	100	30	430				120	3
F. Vitsenap	15/6-1/7	10160	103	0,7	14,3	100	100			950			150	14
G. Oljerättika	15/6-1/7	10010	101	0,7	14,2	100	100				970		150	16
-X-		9990						60	370					
CV%		1,7						64,1	22,1					
OBS		28						16	16					
PROB F1		.2654						.3069	.1803					

ANSVARIG: Lennart Mattsson (2003-06-03)