



RESULTAT

Markvetenskap
Växtnäringslära

2002

L3-2259

M-508-2002 03C060

1

Etablering av fånggröda i höstvete

Lars Åke Johannesson
Kastanjegården, 222 51 Lund

DATUM FÖR GRUNDGÖDSLING KG/HA N P K

GRÖDA: HÖSTVETE SÅDATUM: 2001-10-20
SORT: TARSO FÖRFRUKT: KORN

JORDART: mmh Molättlera

pH-värde: 7,4 P-HCl:

P-AL: 5,7 K-HCl:

K-AL: 8,1 T:

Mg-AL: 9,8 S:

Ca-AL: 380

S04-S 0-30 cm:

S04-S 30-60 cm:

Cu-HCl:

B:

K/Mg: 0,8

NEDERBÖRD GÖDSLING-SKÖRD, MM

MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP

18 42 88 95 68 20

MIN-N

NO3-N

NH4-N

KG/HA

F Ö R S Ö K S L E D :

Insåningstidpunkt

A. Utan fånggröda

B. Engelskt rajgräs, Tove (tidig) Slutet av mars

C. Engelskt rajgräs, Condesa (sen) Slutet av mars

D. Rödsvingel, Rubin Slutet av mars

E. Engelskt rajgräs, Tove (tidig) 15/6-1/7

F. Vitsenap 15/6-1/7

G. Oljerättika 15/6-1/7

-X-

CV%

OBS

PROB F1

LSD F1

GRÖNM KLÖV- VER KG/HA 10-23	GRÖNM GRÄS KG/HA 10-23	GRÖNM VIT- SENA KG/HA 10-23	GRÖNM OLJE- RÄTTIKRIGT KG/HA 10-23	GRÖNM ÖV- KG/HA 10-23	TS KG/HA KLÖ- VER 10-23	TS KG/HA GRÄS 10-23	TS KG/HA VIT- SENA 10-23	TS KG/HA OLJE- RÄTTIKRIGT 10-23	TS KG/HA ÖV- 10-23	TS % KLÖ- VER	TS % GRÄS	TS % VIT- SENA
				4130					840			
	4890			830		1060			140		21,5	
	4320			90		970			10		22,2	
40	4190			430	0	1110			110	3,5	27,0	
40	1530			1920	0	390			390	2,6	24,3	
		15130		790			2410		140			16,9
			17410	110				2000	20			
					0	880						
					57,6	41,2						
					3	16						
						.0706						
					20							

Höstveteskörden ej bestämd

ANSVARIG: Lennart Mattsson 2003-06-17



RESULTAT

Markvetenskap
Växtnäringslära

2002

L3-2259

M-508-2002 03C060

2

Etablering av fånggröda i höstvete

Lars Åke Johannesson
Kastanjegården, 222 51 Lund

DATUM FÖR GRUNDGÖDSLING KG/HA N P K

GRÖDA: HÖSTVETE SÅDATUM: 2001-10-20
SORT: TARSO FÖRFRUKT: KORN

JORDART: mmh Molättlera

pH-värde: 7,4 P-HCl:

P-AL: 5,7 K-HCl:

K-AL: 8,1 T:

Mg-AL: 9,8 S:

Ca-AL: 380

S04-S 0-30 cm:

S04-S 30-60 cm:

Cu-HCl:

B:

K/Mg: 0,8

NEDERBÖRD GÖDSLING-SKÖRD, MM

MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP

18 42 88 95 68 20

MIN-N

NO3-N

NH4-N

KG/HA

F Ö R S Ö K S L E D:

Insåningstidpunkt

A. Utan fånggröda

B. Engelskt rajgräs, Tove (tidig) Slutet av mars

C. Engelskt rajgräs, Condesa (sen) Slutet av mars

D. Rödsvingel, Rubin Slutet av mars

E. Engelskt rajgräs, Tove (tidig) 15/6-1/7

F. Vitsenap 15/6-1/7

G. Oljerättika 15/6-1/7

-X-

CV%

OBS

PROB F1

LSD F1

Höstveteskörden ej bestämd

ANSVARIG: Lennart Mattsson 2003-06-17