



RESULTAT

Markvetenskap
Växtnäringslära

2002

R3-0056-1

R-516-1978

03C071

1

Jämförelse mellan odlingssystem

Lanna Försöksstation
Saleby, Lidköping

DATUM FÖR

GRUNDGÖDSLING

KG/HA

N

P

K

GRÖDA: KORN
SORT: HENNI

SÅDATUM: 2002-04-10
FÖRFRUKT: VÄRRAPS

JORDART: mmh Styv lera

pH-värde: 6,9

P-AL:

K-AL:

Mg-AL:

Ca-AL:

S04-S 0-30 cm:

S04-S 30-60 cm:

P-HCl:

K-HCl:

T:

S:

Cu-HCl:

B:

K/Mg:

NEDERBÖRD GÖDSLING-SKÖRD, MM

MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP

69 118 60 39

MIN-N

N03-N

NH4-N

KG/HA

F Ö R S Ö K S L E D:

SYST. I GRÄSVALL-FLYTG. NÖT

CV%

KÄRNA RENV. KG/HA	AV- RENS- %	VATT. HALT VID SKÖRD	1000- KORN- VIKT G	N % AV TS KÄRNA	P % AV TS KÄRNA	K % AV TS KÄRNA	PLANT TÄT- HET 0-100 05-10	STRÅ- STYR- KA 0-100 08-22	AX- GÅNG 06-23	MIN-N E. SK KG/HA 0-60 09-20					
4670	3,7	16,7	44,8	1,35	0,29	0,56	100	88	06-23	13					
14,7															

Flytg. NH4-N 2,3, P 0,43, K 3,2 kg/ton
30 ton/ha 04-09

ANSVARIG: Lennart Mattsson 2003-05-23