



RESULTAT

Markvetenskap
Växtnäringslära

2002

R3-1050-13 N-321-1999 03C086

1

Långliggande regionala försök med kalk

Henrik Andersson
Kärleken, Halmstad

GRÖDA:	HÖSTVETE	SÅDATUM: 2001-08-30	DATUM FÖR 2001-08-30	GRUNDGÖDSLING	KG/HA	N	P	K
SORT:	MERIDIEN	FÖRFRUKT: FODERÄRT	2002-04-07	PK 11-21	200		22	42
				NS 27-4	300	81		
				KALKSALPETER	500	78		

JORDART: nmh Lerig sand

pH-värde: 6,0

P-AL: 11,0

K-AL: 7,9

Mg-AL: 9,9

Ca-AL: 69

S04-S 0-30 cm:

S04-S 30-60 cm:

P-HCl:

K-HCl:

T:

S:

54

11,6

4,1

Cu-HCl:

B:

K/Mg:

0,8

NEDERBÖRD GÖDSLING-SKÖRD, MM

MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP

MIN-N

NO3-N

NH4-N

KG/HA

F Ö R S Ö K S L E D :

	KÄRNA RENV. KG/HA	REL - TAL	AV - RENS - %	VATT. HALT VID SKÖRD	RYMD - VIKT G/L	1000 - KORN - VIKT G	PLANT TÄT - HET 0-100 03-15	STRÅ - STYR - KA 0-100 08-07					
A. Ingen kalk	8840	100	1,7	13,7	813	52,2	95	100					
B. Kalkstensmjöl från Köping *)	8680	98	1,8	13,7	813	48,2	95	100					
C. Kalkstensmjöl från Ignaberga	8760	99	1,5	13,8	812	48,5	95	100					
D. Kalkstensmjöl från Ignaberga	8730	99	1,7	13,6	810	46,6	95	100					
E. Kalkstensmjöl från Ignaberga **)	8640	98	1,3	13,6	808	45,0	95	100					
F. Krossad kalksten från Ignaberga	8560	97	1,6	13,6	802	46,1	95	100					
G. Dolomitmjöl, estniskt	8700	98	1,5	13,6	805	44,6	95	100					
H. Krossad dolomit, estnisk	8800	100	1,3	13,7	810	45,9	95	100					
-X-	8710												
CV%	2,7												
OBS	32												
PROB F1	.7898												

*) Gemensamt led för alla försök i serien.

**) Delgivor under fyra år, upp till full giva nåtts år 4.

ANSVARIG: Lennart Mattsson 2002-11-28