



RESULTAT

Markvetenskap
Växtnäringslära

2002

L3-2259

L-211-2002

03C127

1

Etablering av fånggröda i höstvete

Hushållningssällskapet
Sandby Gård, 276 37 Borrbby

DATUM FÖR

GRUNDGÖDSLING

KG/HA

N

P

K

GRÖDA: HÖSTVETE SÅDATUM: 2001-10-19
SORT: OLIVIN FÖRFRUKT: RAPS

JORDART: mmh Lerig mo

pH-värde: 6,5

P-AL: 14,0

K-AL: 11,0

Mg-AL: 7,7

Ca-AL: 160

S04-S 0-30 cm:

S04-S 30-60 cm:

P-HCl:

K-HCl:

T: 13,3

S: 8,9

Cu-HCl:

B:

K/Mg:

NEDERBÖRD GÖDSLING-SKÖRD, MM

MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP

32 38 41 64 26

MIN-N

NO3-N

NH4-N

KG/HA

F Ö R S Ö K S L E D:

Insåningstidpunkt

A. Utan fånggröda

B. Engelskt rajgräs, Tove (tidig) Slutet av mars

C. Engelskt rajgräs, Condesa (sen) Slutet av mars

D. Rödsvingel, Rubin Slutet av mars

E. Engelskt rajgräs, Tove (tidig) 15/6-1/7

F. Vitsenap 15/6-1/7

G. Oljerättika 15/6-1/7

-X-

CV%

OBS

PROB F1

Fånggröda sådd 03-25, 06-17

ANSVARIG: Lennart Mattsson (2003-01-31)