



R E S U L T A T

Markvetenskap
Växtnäringslära

2003

L3-0010

M-590-1951 03D086

1

Växtföljd och skörderester

Hvilans Trädgårdsskola
Kabbarp 7, 232 52 Åkarp

DATUM FÖR

GRUNDGÖDSLING

KG/HA

N P K

GRÖDA: SOCKERBETOR SÅDATUM: 2003-04-04
SORT: NEMAKILL FÖRFRUKT: HÖSTVETE

JORDART: nmh Moränmo

pH-värde: 7,5

P-AL: 14,0

K-AL: 5,0

Mg-AL:

Ca-AL:

S04-S 0-30 cm:

S04-S 30-60 cm:

P-HCl:

K-HCl: 90

T:

S:

Cu-HCl:

B:

K/Mg:

NEDERBÖRD GÖDSLING-SKÖRD, MM

MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP

44 55 53 61 79 49

MIN-N

NO3-N

NH4-N

KG/HA

F Ö R S Ö K S L E D:

A. UTAN HALM OCH BLAST

B. HALMEN BRÄNNES-BLASTEN BORTFÖRES

C. HALMEN OCH BLASTEN NEDPLÖJES

-X-

CV%

OBS

PROB F1

RENA BETOR TON PR HA 09-24	SOC- KER KG/HA	REL- TAL	SOC- KER- HALT %	BLÅ- TAL	K+NA	BLAST TS KG/HA 10-27	TS- HALT BLAST %	PLANT TÄTH. (VÅR) 0-100 05-06	N % AV TS BLAST	PH H2O MATJ.	TOT-N % MATJ.	TOT-C % MATJ.		
58,7	10160	100	17,3	17	4,03	4630	18,7	100	2,30	7,2	0,40	3,03		
55,7	9610	95	17,2	18	3,60	5000	20,7	100	2,12	7,6	0,38	2,83		
57,3	9980	98	17,4	18	3,66	4910	20,0	100	2,18	7,5	0,38	2,78		
57,2	9920													
4,1	5,3													
12	12													
.2798	.3849													

Grundgödsling: Led A PK 7-25 357 kg/ha 04-01

Led B,C PK 7-25 571 kg/ha 04-01

ANSVARIG: Lennart Mattsson

2004-02-18