



RESULTAT

Markvetenskap
Växtnäringslära

2003

L3-2265

R-307-2003

03D110

1

Tidigt kväve till tunna höstvetebestånd

Kjell Boström
Kaptensgården Sparlösa, Vara

DATUM FÖR GRUNDGÖDSLING KG/HA N P K

GRÖDA: Höstvete SÅDATUM: 2003-03-28
SORT: Lars FÖRFRUKT: Vårraps

JORDART: mmh Styv lera

pH-värde: 7,0 P-HCl: 56 Cu-HCl: 12,0

P-AL: 4,7 K-HCl: 270 B:

K-AL: 13,0 T:

Mg-AL: 35,0 S:

Ca-AL: 250

S04-S 0-30 cm:

S04-S 30-60 cm:

NEDERBÖRD GÖDSLING-SKÖRD, MM
MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP

MIN-N N03-N NH4-N
0-60 CM V-03 33 15 KG/HA

F Ö R S Ö K S L E D :				KÄRNA RENV. KG/HA	REL- TAL F1	AV- RENS- %	VATT. HALT VID SKÖRD	RYMD- VIKT G/L	1000- KORN- VIKT G	N % AV TS KÄRNA	PRO- TEIN % AV TS	N- SKÖRD KG/HA	ANTAL SKOTT PER M ²	ANTAL SKOTT PER M ²	ANTAL AX PER M ²				
08-12													03-26	05-27	07-21				
Tidpunkt																			
Led	Tidig ca 1/4	Normal ca 15-25/4	Total N-giva																
A. Ogödslat			0	2910	100	0,5	15,1	809	42,5	1,68	9,60	42	324	492	361				
B.		160	160	6170	212	1,4	14,9	799	42,8	1,70	9,70	89		665	440				
C. 40		120	160	6590	226	0,6	14,9	809	43,5	1,68	9,60	94		732	452				
D. 80		80	160	6430	221	0,9	15,2	805	42,8	1,77	10,10	97		726	453				
-X-				5530															
CV%				5,5															
OBS				16															
PROB F1				.0001															
LSD F1				480															

Gödslingstidpunkter: 03-26, 04-24

ANSVARIG: Ingemar Gruvaeus (2003-10-27)