



RESULTAT

Markvetenskap
Växtnäringslära

2003

L3-2265

U-2-2003

03D112

1

Tidigt kväve till tunna höstvetebestånd

Hushållningssällskapet
Brunnby Gård, Västerås

DATUM FÖR GRUNDGÖDSLING KG/HA N P K

GRÖDA: Höstvete
SORT: Olivin
SÅDATUM:
FÖRFRUKT: Havre

JORDART: mmh Styv lera

pH-värde: 6,6 P-HCl: 67 Cu-HCl: 37,0

P-AL: 7,4 K-HCl: 440 B:

K-AL: 22,0 T:

Mg-AL: 46,0 S:

Ca-AL: 370

S04-S 0-30 cm:

S04-S 30-60 cm:

NEDERBÖRD GÖDSLING-SKÖRD, MM

MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP

37 64 92 37 60 1

MIN-N N03-N NH4-N
0-60 CM 04-07 23 8 KG/HA

F Ö R S Ö K S L E D :				KÄRNA RENV. KG/HA	REL - TAL F1	AV - RENS - %	VATT. HALT VID SKÖRD	RYMD - VIKT G/L	1000 - KORN - VIKT G	N % AV TS KÄRNA	PRO - TEIN % AV TS	N - SKÖRD KG/HA	PLANT TÄT - HET 0-100	STRÅ - STYR - KA 0-100	ANTAL SKOTT PER M ² 06-06	ANTAL AX PER M ²	KOND. OCH VIGÖR 0-100 05-26		
Tidpunkt																			
Led	Tidig ca 1/4	Normal ca 15-25/4	Total N-giva																
A. Ogödslat			0	3150	100	0,6	14,5	754	38,3	1,74	9,90	47	100	100	305	147	45		
B.		160	160	6350	201	0,6	14,4	774	39,5	2,32	13,20	125	100	100	389	235	58		
C. 40		120	160	6680	212	0,7	14,6	773	40,0	2,16	12,30	123	100	100	519	304	90		
D. 80		80	160	6560	208	0,6	14,5	775	39,6	2,18	12,40	121	100	100	421	304	100		
-X-				5680															
CV%				2,5															
OBS				16															
PROB F1				.0001															
LSD F1				230															

Tunna bestånd överallt. Led D = 60 % av "normalbestånd"

Gödslings tidpunkter: 04-08, 05-07

ANSVARIG: Ingemar Gruvaeus (2003-10-15)