



RESULTAT

Markvetenskap
Växtnäringslära

2003

L3-2265

T-3-2003

03D114

1

Tidigt kväve till tunna höstvetebestånd

Lars Håkan Jonsson
Kyrkeby

DATUM FÖR GRUNDGÖDSLING KG/HA N P K

GRÖDA: Höstvete SÅDATUM: 2002-09-08
SORT: Tarso FÖRFRUKT: Höstraps

JORDART: nmh Molättlera

pH-värde: 6,8 P-HCl: 69 Cu-HCl: 16,0

P-AL: 11,0 K-HCl: 250

K-AL: 18,0

Mg-AL: 18,0

Ca-AL: 210

S04-S 0-30 cm:

S04-S 30-60 cm:

B: NEDERBÖRD GÖDSLING-SKÖRD, MM
K/Mg: MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP
29 53 71 104 13

MIN-N N03-N NH4-N
0-60 CM V-03 53 11 KG/HA

				KÄRNA RENV. KG/HA	REL- TAL F1	AV- RENS- %	VATT. HALT VID SKÖRD	RYMD- VIKT G/L	1000- KORN- VIKT G	N % AV TS KÄRNA	PRO- TEIN % AV TS	N- SKÖRD KG/HA	STRÅ- STYR- KA 0-100 08-13	ANTAL SKOTT PER M² 04-03	ANTAL SKOTT PER M² 05-28	ANTAL AX PER M² 07-14			
F Ö R S Ö K S L E D:				08-13															
Tidpunkt																			
Led	Tidig ca 1/4	Normal ca 15-25/4	Total N-giva																
A.	Ogödslat		0	6410	100	1,0	15,8	822	40,7	2,07	11,80	113	100	307	498	415			
B.		160	160	8030	125	1,1	16,8	808	38,8	2,44	13,90	166	100		596	568			
C.	40	120	160	8020	125	0,9	16,2	818	39,4	2,42	13,80	165	100		691	494			
D.	80	80	160	8100	126	0,6	15,8	811	38,6	2,39	13,60	164	100		708	528			
-X-				7640															
CV%				1,6															
OBS				16															
PROB F1				.0001															
LSD F1				200															

Nederbörden är uppmätt ca 3 km från försöket
Gödslingstidpunkter: 04-03, 05-08

ANSVARIG: Ingemar Gruvaeus 052003-11-28