



RESULTAT

Markvetenskap
Växtnäringslära

2003

L3-3091

R-311-2003

03D115

1

Gödsling mot fysiologiska fläckar i höstvete

Stefan Kullander
Hällebergs egd, Vara

GRÖDA:	Höstvete	SÅDATUM:	2003-04-08	GRUNDGÖDSLING	KG/HA	N	P	K
SORT:	Tarso	FÖRFRUKT:	2003-04-23	Svavelsalpeter	225	61		
			2003-06-07	Kalksalpeter	550	85		
				Kalksalpeter	200	31		

JORDART: mmr Sand

pH-värde: 6,9

P-AL: 5,6

K-AL: 9,7

Mg-AL: 10,0

Ca-AL: 210

S04-S 0-30 cm:

S04-S 30-60 cm:

P-HCl: 60

K-HCl: 150

T:

S:

Cu-HCl: 9,6

B:

K/Mg: 1,0

NEDERBÖRD GÖDSLING-SKÖRD, MM

MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP

MIN-N

NO3-N

NH4-N

KG/HA

F Ö R S Ö K S L E D:

KÖRNING															
KÄRNA RENV. KG/HA	REL - TAL F1	AV - RENS - %	VATT . HALT VID SKÖRD	RYMD - VIKT G/L	1000 - KORN - VIKT G	N % AV TS KÄRNA	PRO - TEIN % AV TS	N - SKÖRD KG/HA	STRÅ - STYRK GULM. 0-100	STRÅ - STYR - KA 0-100	BLAD - FLÄCK SVAMP BL. 1 07-21	BLAD - FLÄCK SVAMP BL. 2 08-07			
08-07															
Led	Klorid	Kalium													
	kg/ha														
A. Obehandlat	0	0	7500	100	4,0	14,5	795	33,6	2,30	13,10	147	100	100	83	91
B. Kalciumklorid	50	0	7500	100	5,0	14,4	787	35,6	2,33	13,30	148	100	100	86	90
C. Kaliumklorid	50	50	7540	100	5,2	14,3	790	34,6	2,32	13,20	149	100	100	82	93
-X-			7510												
CV%			1												
OBS			18												
PROB F1			.6245												

ANSVARIG: Ingemar Gruvaeus (2003-11-11)