



RESULTAT

Markvetenskap
Växtnäringslära

2003

L3-3091

U-3-2003

03D118

1

Gödsling mot fysiologiska fläckar i höstvete

Anders Jansson

DATUM FÖR

GRUNDGÖDSLING

KG/HA

N

P

K

GRÖDA: Höstvete
SORT: Kosack

SÅDATUM: 2002-09-15
FÖRFRUKT: Höstvete

JORDART: nmh Molättlera

pH-värde: 6,6

P-AL: 10,0

K-AL: 16,0

Mg-AL: 13,0

Ca-AL: 190

S04-S 0-30 cm:

S04-S 30-60 cm:

P-HCl: 71

K-HCl: 310

T:

S:

Cu-HCl: 25,0

B:

K/Mg:

NEDERBÖRD GÖDSLING-SKÖRD, MM

MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP

37 64 92 37 60

MIN-N

NO3-N

NH4-N

KG/HA

F Ö R S Ö K S L E D:

Led	Klorid kg/ha	Kalium
A. Obehandlat	0	0
B. Kalciumpklorid	50	0
C. Kaliumklorid	50	50
-X-		
CV%		
OBS		
PROB F1		

KÄRNA RENV. KG/HA	REL - TAL F1	AV - RENS - %	VATT - HALT VID SKÖRD	RYMD - VIKT G/L	1000 - KORN - VIKT G	N % AV TS KÄRNA	PRO - TEIN % AV TS	N - SKÖRD KG/HA	STRÅ - STYRK GULM. 0-100	STRÅ - STYR - KA 0-100 09-03			
09-03													
5070	100	1,0	16,7	797	38,3	2,14	12,20	92	100	90			
5000	99	0,9	17,1	795	39,4	2,16	12,30	92	100	90			
5040	99	0,8	17,3	791	39,5	2,18	12,40	93	100	90			
5040													
1,5													
18													
.3669													

ANSVARIG: Ingemar Gruvaeus 052003-11-28