



RESULTAT

Markvetenskap
Växtnäringslära

2003

L3-3091

D-2-2003

03D119

1

Gödsling mot fysiologiska fläckar i höstvete

Anders Hultgren
Vånga Gård, Strängnäs

DATUM FÖR GRUNDGÖDSLING KG/HA N P K

GRÖDA: Höstvete SÅDATUM: 2002-09-20
SORT: Kosack FÖRFRUKT: Vårrybs

JORDART: mmh Mellanlera

pH-värde: 6,3 P-HCl: 65 Cu-HCl: 18,0
P-AL: 4,1 K-HCl: 270 B:
K-AL: 15,0 T: NEDERBÖRD GÖDSLING-SKÖRD, MM
Mg-AL: 19,0 S: MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP
Ca-AL: 200 28 101 39 35

S04-S 0-30 cm:
S04-S 30-60 cm:

MIN-N NO3-N NH4-N

KG/HA

F Ö R S Ö K S L E D:

KÄRNA RENV. KG/HA	REL - TAL F1	AV - RENS - %	VATT - HALT VID SKÖRD	RYMD - VIKT G/L	1000 - KORN - VIKT G	N % AV TS KÄRNA	PRO - TEIN % AV TS	N - SKÖRD KG/HA	STRÅ - STYRK GULM. 0-100	STRÅ - STYR - KA 0-100 08-19			
08-19													
Led	Klorid	Kalium											
	kg/ha												
A. Obehandlat	0	0	6170	100	0,7	18,2	810	43,4	2,25	12,80	118	100	100
B. Kalciumklorid	50	0	6220	101	0,7	18,1	809	47,7	2,28	13,00	121	100	100
C. Kaliumklorid	50	50	6180	100	0,7	18,0	805	46,1	2,26	12,90	119	100	100
-X-			6190										
CV%			1,0										
OBS			18										
PROB F1			.3671										

ANSVARIG: Ingemar Gruvaeus 052003-12-03