



RESULTAT

Markvetenskap
Växtnäringslära

2003

L3-3091

T-5-2003

03D131

1

Gödsling mot fysiologiska fläckar i höstvete

Per Sandberg
Sörby, Valskog, Arboga

DATUM FÖR

GRUNDGÖDSLING

KG/HA

N

P

K

GRÖDA: Höstvete
SORT: Tarso

SÅDATUM: 2002-09-18
FÖRFRUKT: Ärtor

JORDART:

pH-värde:

P-AL:

K-AL:

Mg-AL:

Ca-AL:

S04-S 0-30 cm:

S04-S 30-60 cm:

P-HCl:

K-HCl:

T:

S:

Cu-HCl:

B:

K/Mg:

NEDERBÖRD GÖDSLING-SKÖRD, MM

MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP

71 104 13

MIN-N

NO3-N

NH4-N

KG/HA

F Ö R S Ö K S L E D:

KÄRNA RENV. KG/HA	REL - TAL F1	AV - RENS - %	VATT - HALT VID SKÖRD	RYMD - VIKT G/L	1000 - KORN - VIKT G	N % AV TS KÄRNA	PRO - TEIN % AV TS	N - SKÖRD KG/HA	STRÅ - STYR - KA 0-100 08-13				
08-13													
Led	Klorid	Kalium											
	kg/ha												
A. Obehandlat	0	0	6540	100	4,3	24,2	782	37,0	2,58	14,70	143	100	
B. Kalciumklorid	50	0	6400	98	4,4	24,9	778	35,5	2,60	14,80	141	100	
C. Kaliumklorid	50	50	6210	95	6,1	26,2	781	35,0	2,58	14,70	136	100	
-X-			6390										
CV%			2,0										
OBS			18										
PROB F1			.0045										
LSD F1			170										

Nederbörden är uppmätt ca 50 km från försöket

ANSVARIG: Ingemar Gruvaeus 052003-11-28