



RESULTAT

Markvetenskap
Växtnäringslära

2004

R3-0056-3

R-516-1978

03E017

1

Jämförelse mellan odlingssystem

Lanna Försöksstation
Saleby, Lidköping

GRÖDA:	Höstvete	SÅDATUM: 2003-09-22	DATUM FÖR 2004-04-02	GRUNDGÖDSLING NS 26-4	KG/HA 200	N 52	P	K
SORT:	Kosack	FÖRFRUKT: Havre	2004-05-10	Kalksalpeter S	650	99		

JORDART: mmh Styv lera

pH-värde: 6,9

P-AL: P-HCl:

K-AL: K-HCl:

Mg-AL: T:

Ca-AL: S:

Cu-HCl:

B:

K/Mg:

NEDERBÖRD GÖDSLING-SKÖRD, MM

MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP

17 34 91 126 61

MIN-N

NO3-N

NH4-N

KG/HA

F Ö R S Ö K S L E D:

SYST. III AVSALUGR. INTENSIVT
CV%

KÄRNA RENV. 15% KG/HA 09-06	AV- RENS- % 1,2	VATT. HALT VID SKÖRD 17,3	1000- KORN- VIKT G 37,1	N % AV TS 1,98	P % AV TS 0,38	K % AV TS 0,46	PLANT TÄTH. FÖREG HÖST 100	PLANT TÄT- HET 0-100 05-01	STRÅ- STYR- KA 0-100 09-06	AX- GÅNG 06-16	MIN-N E. SK KG/HA 15				
6090 3,5	1,2	17,3	37,1	1,98	0,38	0,46	100	90	87	06-16	15				

ANSVARIG: Lennart Mattsson 2005-06-09