



RESULTAT

Markvetenskap
Växtnäringslära

2004

R3-0056-4

R-516-1978

03E018

1

Jämförelse mellan odlingssystem

Lanna Försöksstation
Saleby, Lidköping

GRÖDA: Höstvete SÅDATUM: 2003-09-22 DATUM FÖR 2004-04-27 GRUNDGÖDSLING KG/HA N P K
SORT: Kosack FÖRFRUKT: Havre Kalksalpeter S 495 75

JORDART: mmh Styv lera

pH-värde: 6,9

P-AL: P-HCl:

K-AL: K-HCl:

Mg-AL: T:

Ca-AL: S:

Cu-HCl:

B:

K/Mg:

NEDERBÖRD GÖDSLING-SKÖRD, MM

MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP

1 34 91 126 61

MIN-N

NO3-N

NH4-N

KG/HA

F Ö R S Ö K S L E D:

SYST. IV AVSALUGR. EXTENSIVT
CV%

KÄRNA RENV. 15% KG/HA 09-06	AV- RENS- % %	VATT. HALT VID SKÖRD	1000- KORN- VIKT G	N % AV TS KÄRNA	P % AV TS KÄRNA	K % AV TS KÄRNA	PLANT TÄTH. FÖREG HÖST 11-27	PLANT TÄT- HET 0-100 05-01	STRÅ- STYR- KA 0-100 09-06	AX- GÅNG 06-15	MIN-N E. SK KG/HA 0-60 10-08				
4430 6,5	1,3	17,8	35,7	1,66	0,36	0,44	100	90	95	06-15	11				

ANSVARIG: Lennart Mattsson 2005-06-09