R E S U L T A T 2007 M3-2280 U-137-2007 03H136

Markvetenskap
Växtnäringslära

Optimal kvävegödsling till ensilagemajs

Äsplunda Lantbruk
Enköping

			DATUM FÖR	GRUNDGÖDSLING	KG/HA	N	P	K	S
GRÖDA:	Ensilagemajs	SÅDATUM: 2007-05-03	2007-05-03	MAP	150	18	35		
SORT:	Avenir	FÖRFRUKT: Majs							

JORDART:
pH-värde: P-HCl: Cu-HCl:
P-AL: K-HCl: B: NEDERBÖRD GÖDSLING-SKÖRD, MM
K-AL: CEC: K/Mg: MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP
Mg-AL: S:
Ca-AL:
Lerhalt: MIN-N NO3-N NH4-N
Mullhalt: 0-90 CM 06-01 233 15 KG/HA

F Ö R S Ö K S L E D:		SKÖRD TS KG/HA 10-16	REL-TAL F1	TS-HALT %	NO3 0-30 KG/HA E.SK.	NO3 30-60 KG/HA E.SK.	NO3 60-90 KG/HA E.SK.	NO3 0-90 KG/HA E.SK	NH4 0-30 KG/HA E.SK.	NH4 30-60 KG/HA E.SK.	NH4 60-90 KG/HA E.SK.	NH4 0-90 KG/HA E.SK.	NMIN. 0-90 KG/HA E.SK.		
Led	Gödsling	N kg/ha													
A.	165 kg MAP	20	8070	100	29,0	34	25	15	75	5	2	3	11	86	
B.	165 kg MAP + 185 Axan	70	8730	108	28,4	82	37	25	144	7	2	6	15	159	
C.	165 kg MAP + 370 Axan	120	8650	107	27,7	68	28	41	138	6	4	3	13	151	
D.	165 kg MAP + 556 Axan	170	9710	120	30,2	90	39	45	173	5	3	4	12	185	
E.	165 kg MAP + 741 Axan	220	8400	104	26,9	133	42	52	226	7	2	6	16	242	
-X-			8710												
CV%			7,5												
OBS			20												
PROB F1			.0385												
LSD F1			1000												

ANSVARIG: Ingemar Gruvaeus 2008-03-30