



RESULTAT

Markvetenskap
Växtnäringslära

2007

M3-3097

R-313-2007

03H140

1

Optimal fosforgödsling till ensilagemajs

Torbjörn Larm
Sven-Jönsgården, Lundsbrunn

GRÖDA:	Ensilagemajs	SÅDATUM: 2007-05-04	DATUM FÖR	GRUNDGÖDSLING	KG/HA	N	P	K	S
SORT:		FÖRFRUKT: Majs	2007-05-02	Stallgödsel, ton	70				
			2007-05-02	NS 27-4	500	135			20

JORDART: mmh Lerig sand

pH-värde: 5,8

P-AL: 5,5

K-AL: 10,0

Mg-AL: 4,8

Ca-AL: 52

Lerhalt: 6

Mullhalt: 3,3

P-HCl: 43

K-HCl: 44

CEC:

S:

Cu-HCl: 2,7

B:

K/Mg: 2,1

NEDERBÖRD GÖDSLING-SKÖRD, MM

MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP

MIN-N

NO3-N

NH4-N

KG/HA

F Ö R S Ö K S L E D:

Led	Startgiva	P kg/ha	N kg/ha
A.	Ingen startgiva	0	0
B.	150 kg MAP	35	18
C.	67 kg Axan	0	18
D.	175 kg P20	35	0
E.	88 kg P20	18	0

-X-

CV%

OBS

PROB F1

SKÖRD TS KG/HA	REL- TAL F1	TS- HALT %												
10-10														
11250	100	26,7												
12170	108	30,3												
11780	105	26,7												
12110	108	30,6												
12190	108	30,9												
11900														
10,5														
20														
.8008														

ANSVARIG: Anna-Karin Krijger2008-03-30