



RESULTAT

Mark och miljö
Växtnäring

2008

D3-0150A

N-301-2007

03K151

1

Kväveeffekt i kycklinggödsel

Hs Halland 035-46500

L:a Böslid 310 31 Eldsberga

GRÖDA: Rågvete SÅDATUM: 2007-09-27
SORT: Fidelio FÖRFRUKT: Vårkorn

JORDART: mmh Lerig sand

pH-värde: 6,4

P-AL: 11,3

K-AL: 10,4

Mg-AL: 12,4

Ca-AL: 159

Lerhalt: 10

Mullhalt: 3,7

P-HCl: 48

K-HCl: 73

CEC:

S:

Cu-HCl: 1,0

B:

K/Mg: 0,8

NEDERBÖRD GÖDSLING-SKÖRD, MM

MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP

DATUM FÖR GRUNDGÖDSLING KG/HA N P K S

MIN-N

NO3-N

NH4-N

KG/HA

F Ö R S Ö K S L E D:

A. Kontroll, 0 kg N/ha
B. Broilergödsel, 120 kg/ha N, nedbr tidig vår
C. Broilergödsel, 200 kg/ha N, nedbr tidig vår
D. Broilergödsel, 120 kg/ha N, nedbr vid sådd
E. Broilergödsel, 200 kg/ha N, nedbr vid sådd
F. KAS N27, 40 kg/ha N, nedbrukat vid sådd
G. KAS N27, 80 kg/ha N, nedbrukat vid sådd
H. KAS N27, 120 kg/ha N, nedbrukat vid sådd

-X-

CV%

OBS

PROB F1

LSD F1

KÄRNA RENV. 15% KG/HA 08-13	REL- TAL F1	AV- RENS- %	VATT. HALT VID SKÖRD	RYMD- VIKT G/L	1000- KORN- VIKT G	PRO- TEIN- HALT% AV TS	ERGO- STEROLKELSE	STÄR- KELSE %	N % AV TS KÄRNA	N- SKÖRD KG/HA	STRÄ- STYR- KA 0-100 08-13	
3370	100	0,3	21,1	707	40,2	6,3	7,9	74,6	1,11	32	100	
3960	118	0,4	21,0	707	42,9	6,3	8,1	74,7	1,10	37	100	
4030	120	0,4	21,0	704	43,4	6,7	8,9	74,2	1,17	40	100	
3880	115	0,4	21,0	706	42,1	6,6	8,4	74,3	1,17	38	100	
3650	109	0,4	21,0	700	41,5	6,5	8,2	74,5	1,14	35	100	
3880	115	0,3	21,0	706	42,1	6,4	8,1	74,5	1,12	37	100	
4030	120	0,3	21,0	708	42,7	6,4	8,6	74,4	1,13	39	100	
3750	111	0,3	20,9	705	42,1	6,5	8,7	74,3	1,14	36	100	
3820		0,3	21,0	705	42,1	6,5	8,4	74,4	1,13	37		
12,9		33,9	0,7	0,7	5,2	2,5	8,9	0,4	2,5	12,4		
32		32	32	32	32	32	32	32	32	32		
.5710		.7845	.9602	.4022	.6161	.0210	.6107	.2031	.0210	.3413		
						0,2			0,04			

Efterverkan 2008

ANSVARIG: Erik Ekre

2008-10-28