



RESULTAT

Mark och miljö
Växtnäring

2010

R3-0056-1

R-516-1978

03M037

1

Jämförelse mellan odlingssystem

Lanna Försöksstation
Saleby, Lidköping

GRÖDA: Gräsvall II SÅDATUM:
SORT: FÖRFRUKT: Gräsvall I

JORDART: mmh Styv lera

pH-värde: 6,9

P-AL:

K-AL:

Mg-AL:

Ca-AL:

P-HCl:

K-HCl:

CEC:

S:

Cu-HCl:

B:

K/Mg:

NEDERBÖRD GÖDSLING-SKÖRD, MM

MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP

MIN-N

NO3-N

NH4-N

KG/HA

F Ö R S Ö K S L E D:	TS	TS	TS	TS-	TS-	N	N	SLU-	GRÄS	ÖVR.	pH	P-AL	K-AL	Ca-AL	Mg-AL	TOT-N
	KG/HA	KG/HA	KG/HA	HALT	HALT	% AV	% AV	TENH.	GRAD	GRAD	H2O	MG/	MG/	MG/	MG/	%
	SK. 1	SK. 2	TOT.	%	%	TS	TS	VÅR	SK. 1	SK. 1	MATJ.	100G	100G	100G	100G	MATJ.
	SK.	SK. 1	SK.	SK. 1	SK. 2	SK.1	SK.2	0-100	0-100	0-100	2007	2007	2007	2007	2007	2007
SYST. I GRÄSVALL-FLYTG. NÖT	5160	6240	11390	22,2	34,2	1,95	1,44	85	85	15	6,8	3,1	11,6	294	23,7	0,19
CV%	3,3	20,8	9,9													

Stallgödselinnehåll kg/ton: N: 4,2 P: 0,7 K: 4,6

ANSVARIG: Lennart Mattsson 2011-05-04

ANSVARIG: Lennart Mattsson 2011-05-04