



RESULTATBLANKETT, OGRÄS+SKÖRD 2000

Fältforskningsenheten, ogräsreglering

PLAN: L5- 240-2000 Åkervens och örtogräs i höstvet, höst och vår

ADB-NR: 05A310 LÅN-FNR: E-164-1999 JBR.OMR: 12b

SIDA 1

ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404

GRÖDA: Höstvet

FÖRSÖKSVÄRD: Gösta Pettersson

ADRESS: Axstad, Skänninge

SORT: Pagode
SÅTT DEN: 1999-09-09 KG/HA: 180
FÖRFRUKT: Årter
JORDART: NÅGOT MULLHALTIG LERIG SAND
PH-VÄRDE:

GÖDSLING
PK 10-21 (höst)
NS 27-3
Kalksalpeter

DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
	100		10	21
2000-04-21	300	81		
2000-05-21	350	54		

VÄXTSKYDD

DATUM

RESULTAT:

FÖRSÖKSLED:

	Lomme		Lomme		Övriga ettåriga örtog		Övriga ettåriga örtog		Samtliga ettåriga örtog		Samtliga ettåriga örtog		Kvick-rot *		Kvick-rot *		
	st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal	st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal	st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal	st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal	
	07-28		07-28		07-28		07-28		07-28		07-28		07-28		07-28		
A. Obehandlat	12.3	100	9.3	100	11.3	100	14.0	100	23.5	100	23.3	100	8.3	100	20.3	100	
B. 2.5 l Arelon + 1.2 l Duplosan Meko 1)	0.0	0	0.0	0	2.5	22	1.5	11	2.5	11	1.5	6	15.0	182	26.3	130	
C. 1.5 l Cougar 1)	0.0	0	0.0	0	1.3	11	0.8	5	1.3	5	0.8	3	7.5	91	15.8	78	
D. 1.25 l Bacara 1)	0.0	0	0.0	0	2.0	18	3.8	27	2.0	9	3.8	16	6.5	79	20.5	101	
E. 0.1 l Flexidor + 2.0 l Boxer 1)	0.0	0	0.0	0	3.0	27	6.3	45	3.0	13	6.3	27	2.8	33	6.3	31	
F. 2.0 l Boxer 1) + 1.5 tabl (7.5 g) Express + 0.1 l Lissapol Bio 3)	0.0	0	0.0	0	2.8	24	0.8	5	2.8	12	0.8	3	7.3	88	20.0	99	
G. 0.5 l Cougar 1) + 18.75 g Monitor + 0.2 l Lissapol Bio 4)	0.0	0	0.0	0	1.0	9	0.8	5	1.0	4	0.8	3	3.3	39	8.0	40	
H. 60 g Lexus Class 2)	0.0	0	0.0	0	2.5	22	2.3	16	2.5	11	2.3	10	3.0	36	8.5	42	
I. 60 g Lexus Class 3)	0.0	0	0.0	0	2.3	20	1.0	7	2.3	10	1.0	4	2.3	27	4.0	20	
J. 0.1 l Primus + 12.5 g Monitor + 0.2 l Lissapol Bio 3)	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.8	10	0.5	3	
K. 0.5 l Cougar + 18.75 g Monitor + 0.2 l Lissapol Bio 4)	0.3	2	0.0	0	1.3	11	1.5	11	1.5	6	1.5	6	3.5	42	7.8	38	
L. 18.75 g Monitor + 0.2 l Lissapol Bio 4)	0.0	0	0.0	0	28.0	249	32.8	234	28.0	119	32.8	141	1.0	12	1.0	5	

-X-

CV%

OBS

PROB F1

LSD F1

- 1) Då grödan har 1-1.5 blad på hösten
- 2) Då grödan har 3-4 blad på hösten
- 3) Vid tillväxtens början på våren
- 4) Vid grödans stadium DC 25 på våren

ANM:

Led J block II kasserad p.g.a. felbeh.

Skörden i block I KASSERAD av Fältforskningsenheten p.g.a. torskada.

Missfärgningar: Gula fläckar på bladen.



RESULTATBLANKETT, OGRÄS+SKÖRD 2000

Fältforskningsenheten, ogräsreglering

PLAN: L5- 240-2000 Åkerv och örtgräs i höstvet, höst och vår

ADB-NR: 05A310 LÅN-FNR: E-164-1999 JBR.OMR: 12b

SIDA 2

ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404

GRÖDA: Höstvet

FÖRSÖKSVÄRD: Gösta Pettersson

ADRESS: Axstad, Skänninge

SORT: Pagode
SÅTT DEN: 1999-09-09 KG/HA: 180
FÖRFRUKT: Årter
JORDART: NÅGOT MULLHALTIG LERIG SAND
PH-VÄRDE:

GÖDSLING
PK 10-21 (höst)
NS 27-3
Kalksalpeter

DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
	100		10	21
2000-04-21	300	81		
2000-05-21	350	54		

VÄXTSKYDD

DATUM

RESULTAT:

FÖRSÖKSLED:

A. Obehandlat
B. 2.5 l Arelon + 1.2 l Duplosan Meko 1)
C. 1.5 l Cougar 1)
D. 1.25 l Bacara 1)
E. 0.1 l Flexidor + 2.0 l Boxer 1)
F. 2.0 l Boxer 1) + 1.5 tabl (7.5 g) Express + 0.1 l Lissapol Bio 3)
G. 0.5 l Cougar 1) + 18.75 g Monitor + 0.2 l Lissapol Bio 4)
H. 60 g Lexus Class 2)
I. 60 g Lexus Class 3)
J. 0.1 l Primus + 12.5 g Monitor + 0.2 l Lissapol Bio 3)
K. 0.5 l Cougar + 18.75 g Monitor + 0.2 l Lissapol Bio 4)
L. 18.75 g Monitor + 0.2 l Lissapol Bio 4)

-X-
CV%
OBS
PROB F1
LSD F1

1) Då grödan har 1-1.5 blad på hösten
2) Då grödan har 3-4 blad på hösten
3) Vid tillväxtens början på våren
4) Vid grödans stadium DC 25 på våren

Åkerv*		Åkerv*														
st/m2	Rel	g/m2	Rel													
07-28	tal	07-28	tal													
36.0	100	54.3	100													
0.0	0	0.0	0													
0.0	0	0.0	0													
0.0	0	0.0	0													
0.0	0	0.0	0													
0.0	0	0.0	0													
0.0	0	0.0	0													
0.3	1	0.5	1													
0.5	1	0.3	0													
0.5	1	0.5	1													
0.0	0	0.0	0													
0.0	0	0.0	0													
0.0	0	0.0	0													

ANM:

Led J block II kasserad p.g.a. felbeh.
Skörden i block I KASSERAD av Fältforskningsenheten p.g.a. torskada.
Missfärgningar: Gula fläckar på bladen.



RESULTATBLANKETT, OGRÄS+SKÖRD 2000

Fältforskningsenheten, ogräsreglering

PLAN: L5- 240-2000 Åkervens och örtogräs i höstvet, höst och vår

ADB-NR: 05A310 LÅN-FNR: E-164-1999 JBR.OMR: 12b

SIDA 3

ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404

GRÖDA: Höstvet

FÖRSÖKSVÄRD: Gösta Pettersson

ADRESS: Axstad, Skänninge

SORT: Pagode
SÅTT DEN: 1999-09-09 KG/HA: 180
FÖRFRUKT: Årter
JORDART: NÅGOT MULLHALTIG LERIG SAND
PH-VÄRDE:

GÖDSLING
PK 10-21 (höst)
NS 27-3
Kalksalpeter

DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
	100		10	21
2000-04-21	300	81		
2000-05-21	350	54		

VÄXTSKYDD

DATUM

RESULTAT:

FÖRSÖKSLED:

A. Obehandlat
B. 2.5 l Arelon + 1.2 l Duplosan Meko 1)
C. 1.5 l Cougar 1)
D. 1.25 l Bacara 1)
E. 0.1 l Flexidor + 2.0 l Boxer 1)
F. 2.0 l Boxer 1) + 1.5 tabl (7.5 g) Express + 0.1 l Lissapol Bio 3)
G. 0.5 l Cougar 1) + 18.75 g Monitor + 0.2 l Lissapol Bio 4)
H. 60 g Lexus Class 2)
I. 60 g Lexus Class 3)
J. 0.1 l Primus + 12.5 g Monitor + 0.2 l Lissapol Bio 3)
K. 0.5 l Cougar + 18.75 g Monitor + 0.2 l Lissapol Bio 4)
L. 18.75 g Monitor + 0.2 l Lissapol Bio 4)

-X-
CV%
OBS
PROB F1
LSD F1

Skörd renv kg/ha 08-18	Rel tal	Av rens pro cent	Vat ten halt skörd	Liter vikt g	Miss färgn höst 0-100 10-15	Nek roser höst 0-100 10-15	Nek roser höst 0-100 10-29	Nek roser vår 0-100 05-04	Strå st vid skörd 08-18							
5560	100	1.1	17.3	774	0	0	0	0	88							
5960	107	0.7	17.2	791	0	0	0	0	80							
6460	116	0.7	17.5	781	3	1	0	0	61							
6250	112	0.7	16.6	788	9	6	0	0	59							
5800	104	1.0	16.6	776	6	3	0	0	83							
6680	120	0.7	17.1	778	9	5	0	0	80							
6570	118	0.8	17.0	785	0	0	0	0	45							
6760	122	0.8	16.4	796			2	0	61							
6580	118	0.6	17.0	800				2	38							
6170	111	0.7	17.3	784				0	56							
6120	110	1.2	16.8	785					44							
6120	110	0.6	16.9	794					47							
6260									62							
8.3									49							
35									48							
.2049									.2789							
900									44							

- 1) Då grödan har 1-1.5 blad på hösten
2) Då grödan har 3-4 blad på hösten
3) Vid tillväxtens början på våren
4) Vid grödans stadium DC 25 på våren

ANM:

Led J block II kasserad p.g.a. felbeh.
Skörden i block I KASSERAD av Fältforskningsenheten p.g.a. torskada.
Missfärgningar: Gula fläckar på bladen.

Sprutjournal

ADB-nr:	05A310
Plan-nr:	L5- 240-2000
Försöksnr:	E-164-1999
Närmaste väderstrn:	Vättern

	Spruttillfälle					
	1	2	3	4	5	6
Behandlade försöksled:	B-G	H	F,I,J	G,K,L		
Typ av spruta:	Västerås	Västerås	Västerås	Västerås		
Spridare, typ:						
Arbetsstryck, MPa:	0.20	0.20	0.21	0.20		
Datum:	1999-09-29	1999-10-15	2000-04-20	2000-05-04		
Tid på dagen:	10.00-11.00	12.10-12.30	14.00-15.00	11.20-12.30		
Grödans utveckling (decimalskalan):	11.5	12.5	23	30		
Grödans täthet (gles, normal, tät):	normal	normal	<u>normal</u> -tät	normal		
Ogräsens utveckling:	Hjärtblad	11-12	<u>21-22</u>	23		
Ogräsbestånd (glest, normalt, tätt):	normalt	normalt	tätt	tätt		
Tillväxthastighet (låg, normal, hög):	hög	normal	normal	hög		
Temperatur, °C (30 cm ovan mark):	13.0	11.0	17.0	14.2		
Rel. fuktighet, % (30 cm ovan mark):	83.0	61.7	61.2	51.2		
Markfuktighet (våt, normal, torr):	våt	normal	våt	normal		
Molnighet, %:	80	0	10	30		
Vindhastighet i ögonhöjd, m/s:	3.0	1.0	0.8	1.1		
Vindriktning över rutorna (längs, tvärs, diagonalt):	diagonalt	diagonalt	längs	tvärs		
Dagg (mycket, måttlig, ingen):	ingen	ingen	ingen	måttlig		
Förekomst av frost eller torka:	nej	lätt frost innan	nej	nej		
Regnfri tid efter behandling:	ca 10 tim	> 20 tim	> 20 tim			
Övrigt:	Vindskydd monterat	Vindskydd monterat	Vindskydd monterat 1:a veckan utan nattfrost efter till- växtens början.	Vindskydd monterat		

Led J block II kasserat, felbeh (18.75 g Monitor + vätmedel).