

```

R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS      2001
Fältforskningsenheten, ogräsreglering
PLAN:      L5- 307-2001  Örtogräs i höstvete, höst och vår
ADB-NR:    05A407      LÄN-FNR:  H-169-2000      JBR.OMR:  6

FÖRSÖKSVÄRD:  Anders Johansson
ADRESS:      Norr Stäflö, Läckeby

```

ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404

GRÖDA: Höstvete

SORT: Ritmo
SÅTT DEN: 2000-09-14 KG/HA: 170
FÖRFRUKT: Vårvete
JORDART:
PH-VÄRDE:

GÖDSLING

DATUM

MÄNGD KG/HA

N P K

VÄXTSKYDD

DATUM

R E S U L T A T:

F Ö R S Ö K S L E D:

[illegible]

ANM:

Led E utgår p.g.a. fel dosangivelse.

OBS! Baldersbrå och snärjmåra får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. få plantor i led A.

ANM:
Led E utgår p.g.a. fel dosangivelse.
OBS! Baldersbrå och snärjmåra får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. få plantor i led A.



RESULTATBLANKETT, OGRÄS 2001
Fältforskningsenheten, ogräsreglering
PLAN: L5- 307-2001 Örtogräs i höstvete, höst och vår
ADB-NR: 05A407 LÅN-FNR: H-169-2000 JBR.OMR: 6
FÖRSÖKSVÄRD: Anders Johansson
ADRESS: Norr Stäflö, Läckeby

SIDA 3

ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404

GRÖDA: Höstvete

GÖDSLING

DATUM

MÄNGD KG/HA

N P K

SORT: Ritmo
SÅTT DEN: 2000-09-14 KG/HA: 170
FÖRFRUKT: Vårvete
JORDART:
PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD

DATUM

RESULTAT:

FÖRSÖKSLED:

A. Obehandlat
B. 0.75 l Cougar 1)
C. 0.75 l Bacara 1)
D. 1.0 l Duplosan Meko + 0.15 l Lotus 2)
E. 1.33 kg BAS 935 00 H + 0.25 l Lotus 2)
F. 0.25 l Lotus + 1.5 l Duplosan Super 3)
G. 1.5 tabl (7.5 g) Express + 0.6 l Starane 180 + 0.1 l Lissapol Bio 4)
H. 0.75 tabl (3.75 g) Express + 0.3 l Starane 180 + 0.1 l Lissapol Bio 4)
I. 0.6 l Cougar + 20 g Gratil + 0.1 l Lissapol Bio 4)
J. 0.125 kg BAS 641 00 H + 1.0 l BAS 152 00 S 4)


1) Vid grödans 2-3 bladsstadium på hösten
2) Vid grödans 2-3 bladsstadium på hösten, ogräsen uppe, även snärjmåra
3) Mycket tidig vårbeh, 10-14 dygn före normal beh.tidpunkt med Express
4) Vid tillväxtens början på våren

Samtliga ettåriga örtog st/m2 06-27	Rel tal	Samtliga ettåriga örtog g/m2 06-27	Rel tal											
66.5	100	308.0	100											
10.7	16	21.3	7											
5.5	8	5.5	2											
16.0	24	15.5	5											
14.3	22	37.0	12											
5.5	8	11.5	4											
5.0	8	7.0	2											
7.0	11	6.3	2											
4.0	6	6.0	2											

ANM:

Led E utgår p.g.a. fel dosangivelse.

OBS! Baldersbrå och snärjmåra får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. få plantor i led A.



SORT: Ritmo
SÅTT DEN: 2000-09-14 KG/HA: 170
FÖRFRUKT: Vårvete
JORDART:
PH-VÄRDE:

GÖDSLING	DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
----------	-------	-------------	---	---	---

VÄXTSKYDD DATUM

R E S U L T A T:

F Ö R S Ö K S L E D:

A. Obehandlat
B. 0.75 l Cougar 1)
C. 0.75 l Bacara 1)
D. 1.0 l Duplosan Meko + 0.15 l Lotus 2)
E. 1.33 kg BAS 935 00 H + 0.25 l Lotus 2)
F. 0.25 l Lotus + 1.5 l Duplosan Super 3)
G. 1.5 tabl (7.5 g) Express + 0.6 l Starane 180 + 0.1 l Lissapol Bio 4)
H. 0.75 tabl (3.75 g) Express + 0.3 l Starane 180 + 0.1 l Lissapol Bio 4)
I. 0.6 l Cougar + 20 g Gratil + 0.1 l Lissapol Bio 4)
J. 0.125 kg BAS 641 00 H + 1.0 l BAS 152 00 S 4)

- 1) Vid grödans 2-3 bladsstadium på hösten
- 2) Vid grödans 2-3 bladsstadium på hösten, ogräsen uppe, även snärjmåra
- 3) Mycket tidig vårbeh, 10-14 dygn före normal beh.tidpunkt med Express
- 4) Vid tillväxtens början på våren

[illegible]

ANM:

Led E utgår p.g.a. fel dosangivelse.
Grödan i stadium DC 28 05-10.
Försöket EJ SKÖRDAT p.g.a. regn.

Sprutjournal

ADB-nr:	05A407
Plan-nr:	L5- 307-2001
Försöksnr:	H-169-2000
Närmaste väderstn:	Kalmar flygplats

	Spruttillfälle					
	1	2	3	4	5	6
Behandlade försöksled:	B-D		F	G-J		
Typ av spruta:	Sprumo		Agro-Top	Sprumo		
Spridare, typ:	Spalt		Spalt 11002 vs	Spalt		
Arbetsstryck, MPa:	0.225			0.205		
Datum:	2000-10-20		2001-04-10	2001-04-25		
Tid på dagen:	15.30-16.30		10.30	10-10.50		
Grödans utveckling (decimalskalan):	12-14	8-9 cm hög, har börjat växa		24		
Grödans täthet (gles, normal, tät):	normal		normal	normal		
Ogräsens utveckling:	Enl nedan ¹⁾		Enl nedan ²⁾	Enl nedan ³⁾		
Ogräsbestånd (glest, normalt, tätt):	normalt-tätt		normalt	normalt		
Tillväxthastighet (låg, normal, hög):	för årstiden hög		normal	normal		
Temperatur, °C (30 cm ovan mark):	12		10.5	13		
Rel. fuktighet, % (30 cm ovan mark):	94		60	68		
Markfuktighet (våt, normal, torr):	fuktig		normal torr	fuktig		
Molnighet, %:	100		40	95		
Vindhastighet i ögonhöjd, m/s:	1.0-1.8		0.6	1.5		
Vindriktning över rutorna (längs, tvärs, diagonalt):	tvärs		tvärs	diagonalt		
Dagg (mycket, måttlig, ingen):	ingen		ingen	ingen		
Förekomst av frost eller torka:	nej		lätt frost före & efter	nej		
Regnfri tid efter behandling:			40 tim			
Övrigt:	200 l/ha		200 l/ha	200 l/ha		

¹⁾ Raps och pilört upp till 4 örtblad. Snärjmåra upp till 3 kransar. Våtarv, plister, baldersbrå m.fl. uppe.

²⁾ Baldersbrå 5-6 små grenar, våtarv medelstora, förgätmigej 6-8 små blad, plister stor. Mkt liten förekomst av synlig snärjmåra.

³⁾ Snärjmåra upp till 5 kransar. Övriga örtogräs hjärtblad - 8 örtblad, 3-8 cm höga.