



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2001
Fältforskningsenheten, ogräsreglering
PLAN: L5- 306-2001 Örtogräs i höstvete, höst och vår
ADB-NR: 05A412 LÅN-FNR: D-119-2000 JBR.OMR: 13c
FÖRSÖKSVÄRD: Torbjörn Jarl
ADRESS: Klahammar, Stallarholmen

SIDA 1

ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404

GRÖDA: Höstvete

SORT: Kosack
SÅTT DEN: 2000-09-16 KG/HA: 210
FÖRFRUKT: Vårrops
JORDART: NÅGOT MULLHALTIG MELLANLERA
PH-VÄRDE:

GÖDSLING	DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
Kalksalpeter	2001-04-14	330	51		
Kalksalpeter	2001-05-04	490	76		
Kalksalpeter	2001-06-02	270	42		

VÄXTSKYDD	DATUM
-----------	-------

R E S U L T A T:

F Ö R S Ö K S L E D:	Balders-brå		Balders-brå		Förgät-migej		Förgät-migej		Snärj-måra		Snärj-måra				
	st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal	st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal	st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal			
	07-10		07-10		07-10		07-10		07-10		07-10				
A. Obehandlat	2.5	100	22.3	100	11.8	100	12.0	100	20.8	100	21.8	100			
B. 1.2 l Duplosan Meko 1)	4.3	170	0.8	3	0.8	6	0.3	2	12.0	58	3.3	15			
C. 0.75 l Cougar 2)	0.3	10	0.0	0	0.8	6	0.0	0	10.5	51	2.5	11			
D. 0.75 l Bacara 2)	2.3	90	0.0	0	0.3	2	0.0	0	21.8	105	4.0	18			
E. 1.0 l Duplosan Meko + 0.15 l Lotus 2)	2.5	100	1.0	4	0.3	2	0.0	0	8.5	41	5.3	24			
F. 1.33 kg BAS 935 00 H + 0.25 l Lotus 2)															
G. 0.3 l Cougar 2) + [Behovsanpassning av preparat och dos på våren]	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	10.0	48	1.0	5			
H. 1.5 l Duplosan Super + 0.25 l Lotus 3)	1.5	60	0.8	3	4.8	40	1.8	15	12.5	60	0.8	3			
I. 0.125 kg BAS 641 00 H + 1.0 l BAS 152 00 S 4)	0.0	0	0.0	0	3.3	28	1.0	8	5.5	27	1.0	5			
J. 0.1 l Primus + 0.2 l Lissapol Bio 4)	0.0	0	0.0	0	1.0	9	0.5	4	8.5	41	0.5	2			
K. 50 g Ally Class 4)	0.3	10	0.3	1	4.0	34	1.5	13	12.5	60	3.0	14			
L. 25 g Ally Class 4)	0.3	10	0.5	2	5.3	45	2.3	19	16.3	78	3.5	16			
M. 40 g Plattform 4)	3.3	130	10.5	47	20.8	177	10.3	85	7.0	34	1.8	8			
N. 1.5 tabl (7.5 g) Express + 0.6 l Starane 180 + 0.1 l Lissapol Bio 4)	0.8	30	0.5	2	0.5	4	0.0	0	6.0	29	0.8	3			
O. 0.6 l Cougar + 20 g Gratil + 0.1 l Lissapol Bio 4)	1.0	40	0.5	2	3.8	32	1.3	10	3.5	17	0.0	0			
P. 0.1 l Primus + 40 g Plattform 4)	0.0	0	0.0	0	3.5	30	1.0	8	7.3	35	0.8	3			
1) Då grödan har 1.5-2 blad på hösten															
2) Då grödan har 2-3 blad på hösten															
3) Mycket tidig vårbeh, 10-14 dygn före normal beh.tidpunkt med Express															
4) Vid tillväxtens början på våren															

ANM:

Övriga observerade ogräs: Svinmålla, pilört, riddarsporre, lomme.
Led F utgår p.g.a. fel dosangivelse.
OBS! Baldersbrå och kvickrot får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. litet antal i led A.



RESULTATBLANKETT, OGRÄS 2001
Fältforskningsenheten, ogräsreglering
PLAN: L5- 306-2001 Örtogräs i höstvetete, höst och vår
ADB-NR: 05A412 LÅN-FNR: D-119-2000 JBR.OMR: 13c
FÖRSÖKSVÄRD: Torbjörn Jarl
ADRESS: Klahammar, Stallarholmen

SIDA 2
ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404

GRÖDA: Höstvetete

SORT: Kosack
SÅTT DEN: 2000-09-16 KG/HA: 210
FÖRFRUKT: Vårrens
JORDART: NÅGOT MULLHALTIG MELLANLERA
PH-VÄRDE:

GÖDSLING	DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
Kalksalpeter	2001-04-14	330	51		
Kalksalpeter	2001-05-04	490	76		
Kalksalpeter	2001-06-02	270	42		

VÄXTSKYDD	DATUM
-----------	-------

RESULTAT:

FÖRSÖKSLED:

A. Obehandlat
B. 1.2 l Duplosan Meko 1)
C. 0.75 l Cougar 2)
D. 0.75 l Bacara 2)
E. 1.0 l Duplosan Meko + 0.15 l Lotus 2)
F. 1.33 kg BAS 935 00 H + 0.25 l Lotus 2)
G. 0.3 l Cougar 2) + [Behovsanpassning av preparat och dos på våren]
H. 1.5 l Duplosan Super + 0.25 l Lotus 3)
I. 0.125 kg BAS 641 00 H + 1.0 l BAS 152 00 S 4)
J. 0.1 l Primus + 0.2 l Lissapol Bio 4)
K. 50 g Ally Class 4)
L. 25 g Ally Class 4)
M. 40 g Plattform 4)
N. 1.5 tabl (7.5 g) Express + 0.6 l Starane 180 + 0.1 l Lissapol Bio 4)
O. 0.6 l Cougar + 20 g Gratil + 0.1 l Lissapol Bio 4)
P. 0.1 l Primus + 40 g Plattform 4)

Övriga ettåriga örtog		Övriga ettåriga örtog		Samtliga ettåriga örtog		Samtliga ettåriga örtog		Kvick- * rot							
st/m2	Rel tal	st/m2	Rel tal	st/m2	Rel tal	st/m2	Rel tal	g/m2							
07-10		07-10		07-10		07-10		07-10							
10.0	100	4.5	100	45.0	100	60.5	100	0.0							
31.5	315	3.3	72	48.5	108	7.5	12	0.0							
6.8	68	1.0	22	18.3	41	3.5	6	0.3							
3.8	38	0.0	0	28.0	62	4.0	7	0.0							
17.5	175	2.8	61	28.8	64	9.0	15	0.0							
2.0	20	0.3	6	12.0	27	1.3	2	0.0							
1.3	13	0.0	0	20.0	44	3.3	5	0.0							
2.8	28	1.3	28	11.5	26	3.3	5	0.0							
4.0	40	0.3	6	13.5	30	1.3	2	0.3							
0.3	3	0.0	0	17.0	38	4.8	8	0.0							
0.3	3	0.0	0	22.0	49	6.3	10	0.0							
5.8	58	0.8	17	36.8	82	23.3	38	0.0							
1.0	10	0.0	0	8.3	18	1.3	2	0.0							
0.5	5	0.0	0	8.8	19	1.8	3	0.0							
5.3	53	0.8	17	16.0	36	2.5	4	1.0							

- 1) Då grödan har 1.5-2 blad på hösten
2) Då grödan har 2-3 blad på hösten
3) Mycket tidig vårbeh, 10-14 dygn före normal beh.tidpunkt med Express
4) Vid tillväxtens början på våren

ANM:
Övriga observerade ogräs: Svinmålla, pilört, riddarsporre, lomme.
Led F utgår p.g.a. fel dosangivelse.
OBS! Baldersbrå och kvickrot får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. litet antal i led A.



R E S U L T A T B L A N K E T T, SKÖRD 2001
Fältforskningsenheten, ogräsreglering
PLAN: L5- 306-2001 Örtogräs i höstvetete, höst och vår
ADB-NR: 05A412 LÅN-FNR: D-119-2000 JBR.OMR: 13c
FÖRSÖKSVÄRD: Torbjörn Jarl
ADRESS: Klahammar, Stallarholmen

SIDA 1

ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404

GRÖDA: Höstvetete

SORT: Kosack
SÅTT DEN: 2000-09-16 KG/HA: 210
FÖRFRUKT: Vårrens
JORDART: NÅGOT MULLHALTIG MELLANLERA
PH-VÄRDE:

GÖDSLING	DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
Kalksalpeter	2001-04-14	330	51		
Kalksalpeter	2001-05-04	490	76		
Kalksalpeter	2001-06-02	270	42		

VÄXTSKYDD DATUM

R E S U L T A T:

F Ö R S Ö K S L E D:

A. Obehandlat
B. 1.2 l Duplosan Meko 1)
C. 0.75 l Cougar 2)
D. 0.75 l Bacara 2)
E. 1.0 l Duplosan Meko + 0.15 l Lotus 2)
F. 1.33 kg BAS 935 00 H + 0.25 l Lotus 2)
G. 0.3 l Cougar 2) + [Behovsanpassning av preparat och dos på våren]
H. 1.5 l Duplosan Super + 0.25 l Lotus 3)
I. 0.125 kg BAS 641 00 H + 1.0 l BAS 152 00 S 4)
J. 0.1 l Primus + 0.2 l Lissapol Bio 4)
K. 50 g Ally Class 4)
L. 25 g Ally Class 4)
M. 40 g Plattform 4)
N. 1.5 tabl (7.5 g) Express + 0.6 l Starane 180 + 0.1 l Lissapol Bio 4)
O. 0.6 l Cougar + 20 g Gratil + 0.1 l Lissapol Bio 4)
P. 0.1 l Primus + 40 g Plattform 4)

1) Då grödan har 1.5-2 blad på hösten
2) Då grödan har 2-3 blad på hösten
3) Mycket tidig vårbeh, 10-14 dygn före normal beh.tidpunkt med Express
4) Vid tillväxtens början på våren

-X-
CV%
OBS
PROB F1
LSD F1

Skörd renv kg/ha 08-23	Rel tal	Av rens pro cent	Vat ten halt skörd	Liter vikt g	Beh. skada höst 0-100 10-26	Miss färgn vår 0-100 05-22	Nek roser vår 0-100 05-22	Strå st vid skörd 08-23	Ogräs före komst grad 08-23					
5720	100	0.6	16.0	822	0	0	0	100	0					
6240	109	0.4	15.7	823	0	0	0	100	0					
6300	110	0.4	15.7	825	0	0	0	100	0					
6160	108	0.3	15.7	826	0	0	0	100	0					
5800	101	0.4	15.9	820	0	0	0	100	0					
6190	108	0.3	15.7	825	0	0	0	100	0					
6050	106	0.6	15.5	825		0	0	100	0					
6010	105	0.6	15.6	824		5	5	100	0					
6090	106	0.3	15.7	824		0	0	100	0					
6050	106	0.3	15.8	824		10	5	100	0					
6170	108	0.6	15.7	822		5	5	100	0					
6070	106	0.5	15.8	818		10	5	100	0					
6010	105	0.4	15.7	830		0	0	100	0					
5790	101	0.6	15.7	824		10	0	100	0					
6090	106	0.2	15.7	827		10	5	100	0					
6050														
4.1														
60														
.0712														
360														

ANM:

Inga beh.skador 04-25 och 05-10.
Led F utgår p.g.a. fel dosangivelse.



R E S U L T A T B L A N K E T T, SKÖRD 2001
Fältforskningsenheten, ogräsreglering
PLAN: L5- 306-2001 Örtogräs i höstvete, höst och vår
ADB-NR: 05A412 LÅN-FNR: D-119-2000 JBR.OMR: 13c
FÖRSÖKSVÄRD: Torbjörn Jarl
ADRESS: Klahammar, Stallarholmen

SIDA 2

ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404

GRÖDA: Höstvete

	GÖDSLING	DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
	Kalksalpeter	2001-04-14	330	51		
	Kalksalpeter	2001-05-04	490	76		
	Kalksalpeter	2001-06-02	270	42		

SORT: Kosack
SÅTT DEN: 2000-09-16 KG/HA: 210
FÖRFRUKT: Vårrops
JORDART: NÅGOT MULLHALTIG MELLANLERA VÄXTSKYDD DATUM

Y.M15:F1 ** A<>B A<>C C<>E C<>O
Y.M15:F1 * A<>D A<>G A<>J A<>L A<>P B<>E B<>O D<>E D<>O E<>G E<>L G<>O L<>O

Sprutjournal

ADB-nr:	05A412
Plan-nr:	L5- 306-2001
Försöksnr:	D-119-2000
Närmaste väderstr:	Eklången

	Spruttillfälle					
	1	2	3	4	5	6
Behandlade försöksled:	B	C-G	H	G, I-P		
Typ av spruta:	Sprumo	Sprumo	Sprumo	Sprumo		
Spridare, typ:	Spalt	Spalt	Spalt	Spalt		
Arbetsstryck, MPa:	0.2	0.2	0.2	0.2		
Datum:	2000-10-15	2000-10-19	2001-04-25	2001-05-10		
Tid på dagen:	13.00	14.00	13.00	10.00		
Grödans utveckling (decimalskalan):	11	12	21	30		
Grödans täthet (gles, normal, tät):	normal	normal	normal	normal		
Ogräsens utveckling:	Hjärtblad	2 örtblad	4-8 örtblad			
Ogräsbestånd (glest, normalt, tätt):	normalt	normalt	normalt	normalt		
Tillväxthastighet (låg, normal, hög):	hög	hög	normal	normal		
Temperatur, °C (30 cm ovan mark):	14.1	13.9	14.2	14.7		
Rel. fuktighet, % (30 cm ovan mark):	83.2	80.7	67.5	47.6		
Markfuktighet (våt, normal, torr):	våt	våt	normal	normal		
Molnighet, %:	90	90	50	100		
Vindhastighet i ögonhöjd, m/s:	0.5	0	2.5	2.5		
Vindriktning över rutorna (längs, tvärs, diagonalt):	längs	-	diagonalt	diagonalt		
Dagg (mycket, måttlig, ingen):	ingen	ingen	ingen	ingen		
Förekomst av frost eller torka:	nej	nej	nej	nej		
Regnfri tid efter behandling:	> 20 tim	> 20 tim	> 20 tim	> 20 tim		
Övrigt:						