



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2002

Östra SverigeFörsöken

PLAN: L5- 240-2002 Åkervern och örtogräs i höstvetete, höst och vår

ADB-NR: 05A487

LÅN-FNR: E-112-2001 JBR.OMR: 12b

SIDA 1
ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404

GRÖDA: Höstvetete

FÖRSÖKSVÄRD: Göran Roos

ADRESS: Tuna Kungsgård, Rystad, Linköping

GÖDSLING

NPK 20-4-8

Kalksalpeter

DATUM

2002-04-01

2002-05-02

MÄNGD KG/HA

225

600

N P K

45 10 19

93

SORT: Kosack

SÅTT DEN: 2001-09-26 KG/HA: 200

FÖRFRUKT: Ärtor

JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG LERIG SAND

PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD

DATUM



Bearbetat av FFE, SLU

R E S U L T A T:

F Ö R S Ö K S L E D:

A. Obehandlat
B. 2.5 l Arelon + 1.2 l Duplosan Meko 1)
C. 2.0 l Picomax 1)
D. 2.0 l Boxer + 0.2 l Cougar 1)
E. 2.0 l Boxer 1) + 1.5 tabl (7.5 g) Express + 0.1 l Lissapol Bio 4)
F. 0.25 l Cougar 1) + 18.75 g Monitor + 0.2 l Lissapol Bio 4)
G. 0.5 l Cougar 1) + 18.75 g Monitor + 0.2 l Lissapol Bio 4)
H. 60 g Lexus Class 2)
I. 1.5 l Cougar 2)
J. 1.25 l Bacara 2)
K. 200 g Hussar + 0.1 l Lissapol Bio 3)
L. 175 g BAS 680 00 H + 1.0 l Citowett 2000 3)
M. 0.1 l Primus + 12.5 g Monitor + 0.2 l Lissapol Bio 3)
N. 18.75 g Monitor + 1 tabl (5.0 g) Express + 0.2 l Lissapol Bio 4)
O. 18.75 g Monitor + 0.2 l Lissapol Bio 4)
P. 20 g Lexus 50 WG + 0.2 l Lissapol Bio 4)
Q. 40 g Platform + 18.75 g Monitor 4)

- 1) Då grödan har 1-1.5 blad på hösten
2) Då grödan har 2-3 blad på hösten
3) Tidig vår vid tillväxtens början
4) Våren vid tillväxtens början

Dån	Rel	Dån	Rel	Åkerviöl	Åkerviöl	Övriga	Övriga			
st/m2	tal	g/m2	tal	st/m2	Rel	g/m2	Rel	ettåriga	ettåriga	
07-01		07-01		07-01	tal	07-01	tal	örtog	örtog	
								st/m2	st/m2	
11.0	100	19.5	100	13.5	100	31.5	100	22.0	100	48.3
33.0	300	79.3	406	2.0	15	3.3	10	5.3	24	4.3
21.3	193	33.5	172	0.0	0	0.0	0	0.5	2	0.3
33.8	307	79.3	406	0.8	6	1.0	3	1.5	7	1.3
4.3	39	4.0	21	2.0	15	2.8	9	0.0	0	0.0
5.8	52	2.5	13	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
6.3	57	4.8	24	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
2.3	20	0.5	3	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
11.3	102	21.3	109	0.5	4	0.3	1	0.3	1	1.5
8.8	80	8.0	41	0.0	0	0.0	0	0.5	2	0.3
0.0	0	0.0	0	2.8	20	2.0	6	1.5	7	1.0
18.3	166	17.0	87	5.3	39	6.8	21	0.5	2	0.8
22.8	207	9.0	46	9.8	72	26.8	85	1.8	8	1.5
1.7	15	0.8	4	4.3	32	6.7	21	0.3	1	0.3
4.8	43	3.5	18	14.0	104	25.0	79	1.8	8	1.8
0.5	5	0.3	1	15.8	117	49.3	156	0.0	0	0.0
0.8	7	0.3	1	9.5	70	12.5	40	0.8	3	1.3

ANM:

Led H beh med: 60 g Lexus Class 2) + 200 g Hussar + 0.1 l Lissapol Bio 3). Led K beh vid tidp 4).

Led N block II kasserat.

OBS! Fräken och kvickrot får EJ ingå i seriesammanställning p. g. a. ingen förekomst i led A.



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2002

Östra SverigeFörsöken

PLAN: L5- 240-2002 Åkerven och örtogräs i höstvetete, höst och vår

ADB-NR: 05A487

LÅN-FNR: E-112-2001 JBR.OMR: 12b

SIDA 2
ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404

GRÖDA: Höstvetete

FÖRSÖKSVÄRD: Göran Roos

ADRESS: Tuna Kungsgård, Rystad, Linköping

GÖDSLING
NPK 20-4-8
KalksalpeterDATUM
2002-04-01 225
2002-05-02 600N P K
45 10 19
93

SORT: Kosack

SÅTT DEN: 2001-09-26 KG/HA: 200

FÖRFRUKT: Ärtor

JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG LERIG SAND

PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD

DATUM

Bearbetat av FFE, SLU



R E S U L T A T:

F Ö R S Ö K S L E D:

	Samtliga ettåriga örtog Rel st/m2 tal		Samtliga ettåriga örtog Rel g/m2 tal		Fräken *		Kvick- * rot		Åkerven*		Åkerven*				
	07-01		07-01		st/m2	g/m2	st/m2	g/m2	st/m2	Rel tal	st/m2	Rel tal	07-01		
A. Obehandlat	46.5	100	99.3	100	0.0	0.0		0.0	137.5	100	565.0	100			
B. 2.5 l Arelon + 1.2 l Duplosan Meko 1)	40.3	87	86.8	87	0.0	0.0		0.0	19.8	14	57.3	10			
C. 2.0 l Picomax 1)	21.8	47	33.8	34	0.0	0.0		0.0	4.5	3	19.8	3			
D. 2.0 l Boxer + 0.2 l Cougar 1)	36.0	77	81.5	82	0.0	0.0		0.0	0.0	0	0.0	0			
E. 2.0 l Boxer 1) + 1.5 tabl (7.5 g) Express + 0.1 l Lissapol Bio 4)	6.3	13	6.8	7	0.0	0.0		0.0	1.8	1	1.8	0			
F. 0.25 l Cougar 1) + 18.75 g Monitor + 0.2 l Lissapol Bio 4)	5.8	12	2.5	3	0.0	0.0		0.0	0.0	0	0.0	0			
G. 0.5 l Cougar 1) + 18.75 g Monitor + 0.2 l Lissapol Bio 4)	6.3	13	4.8	5	0.0	0.0		0.0	0.0	0	0.0	0			
H. 60 g Lexus Class 2)	2.3	5	0.5	1	0.3	1.8		4.5	0.0	0	0.0	0			
I. 1.5 l Cougar 2)	12.0	26	23.0	23	0.0	0.0		0.0	16.3	12	68.0	12			
J. 1.25 l Bacara 2)	9.3	20	8.3	8	0.0	0.0		1.8	0.3	0	2.5	0			
K. 200 g Hussar + 0.1 l Lissapol Bio 3)	4.3	9	3.0	3	0.0	0.0		0.8	0.3	0	0.3	0			
L. 175 g BAS 680 00 H + 1.0 l Citowett 2000 3)	24.0	52	24.5	25	0.0	0.0		0.0	2.5	2	3.8	1			
M. 0.1 l Primus + 12.5 g Monitor + 0.2 l Lissapol Bio 3)	34.3	74	37.3	38	0.0	0.0		0.0	1.5	1	0.5	0			
N. 18.75 g Monitor + 1 tabl (5.0 g) Express + 0.2 l Lissapol Bio 4)	6.0	13	7.7	8	0.0	0.0		0.0	1.7	1	0.8	0			
O. 18.75 g Monitor + 0.2 l Lissapol Bio 4)	20.5	44	30.3	30	0.3	2.3		0.0	0.3	0	0.3	0			
P. 20 g Lexus 50 WG + 0.2 l Lissapol Bio 4)	16.3	35	49.5	50	0.0	0.0		0.0	57.8	42	100.3	18			
Q. 40 g Platform + 18.75 g Monitor 4)	11.0	24	14.0	14	0.0	0.0		0.0	0.0	0	0.0	0			

- 1) Då grödan har 1-1.5 blad på hösten
- 2) Då grödan har 2-3 blad på hösten
- 3) Tidig vår vid tillväxtens början
- 4) Våren vid tillväxtens början

ANM:

Led H beh med: 60 g Lexus Class 2) + 200 g Hussar + 0.1 l Lissapol Bio 3). Led K beh vid tidp 4).

Led N block II kasserat.

OBS! Fräken och kvickrot får EJ ingå i seriesammanställning p. g. a. ingen förekomst i led A.



R E S U L T A T B L A N K E T T, SKÖRD 2002

SIDA 1

Östra SverigeFörsöken

ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404

PLAN: L5- 240-2002 Åkervens och örtogräs i höstvet, höst och vår

ADB-NR: 05A487

LÅN-FNR: E-112-2001 JBR.OMR: 12b

GRÖDA: Höstvet

FÖRSÖKSVÄRD: Göran Roos

ADRESS: Tuna Kungsgård, Rystad, Linköping

GÖDSLING

NPK 20-4-8

Kalksalpeter

DATUM

2002-04-01

2002-05-02

MÄNGD KG/HA

225

600

N

45

93

P

10

K

19

SORT: Kosack

SÅTT DEN: 2001-09-26 KG/HA: 200

FÖRFRUKT: Ärtor

JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG LERIG SAND

PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD

DATUM

Bearbetat av FFE, SLU



R E S U L T A T:

F Ö R S Ö K S L E D:	Skörd renv kg/ha 08-09	Rel tal	Av rens pro cent	Vat ten halt skörd	Liter vikt g	Miss färgn höst 0-100 10-22	Miss färgn vår 0-100 05-15	Tillv häm vår 0-100	Vat ten skada 0-100 04-22	Strå st vid skörd 08-09	Ogräs före komst grad 08-09				
A. Obehandlat	3180	100	5.2	14.4	773	0	0	0	0	80	88				
B. 2.5 l Arelon + 1.2 l Duplosan Meko 1)	4390	138	3.8	14.8	789	0	0	0	0	91	25				
C. 2.0 l Picomax 1)	4710	148	2.6	14.7	793	0	0	0	0	79	15				
D. 2.0 l Boxer + 0.2 l Cougar 1)	4690	147	3.1	15.3	792	30	0	29	0	96	5				
E. 2.0 l Boxer 1) + 1.5 tabl (7.5 g) Express + 0.1 l Lissapol Bio 4)	4350	137				0	0	0	8	76	1				
F. 0.25 l Cougar 1) + 18.75 g Monitor + 0.2 l Lissapol Bio 4)	4770	150	2.9	15.2	795	0	0	0	5	93	2				
G. 0.5 l Cougar 1) + 18.75 g Monitor + 0.2 l Lissapol Bio 4)	4440	140	2.7	14.8	783	0	0	0	1	99	1				
H. 60 g Lexus Class 2)	4920	154	3.1	14.7	786		0	0	0	100	1				
I. 1.5 l Cougar 2)	4530	142	2.6	14.6	785		0	0	0	78	19				
J. 1.25 l Bacara 2)	4540	143	3.0	14.3	783		0	0	0	89	3				
K. 200 g Hussar + 0.1 l Lissapol Bio 3)	4620	145	2.1	14.3	796		4	1	0	95	5				
L. 175 g BAS 680 00 H + 1.0 l Citowett 2000 3)	4930	155	2.2	14.4	791		0	0	0	98	6				
M. 0.1 l Primus + 12.5 g Monitor + 0.2 l Lissapol Bio 3)	4400	138	5.9	14.6	789		0	0	1	100	2				
N. 18.75 g Monitor + 1 tabl (5.0 g) Express + 0.2 l Lissapol Bio 4)	4640	146	2.9	14.4	781		5	0	0	93	3				
O. 18.75 g Monitor + 0.2 l Lissapol Bio 4)	4820	151	2.4	14.7	782		5	0	0	80	3				
P. 20 g Lexus 50 WG + 0.2 l Lissapol Bio 4)	3610	114	2.3	15.0	787		20	43	0	83	74				
Q. 40 g Platform + 18.75 g Monitor 4)	4430	139	6.0	15.1	749		1	0	0	99	2				
1) Då grödan har 1-1.5 blad på hösten															
2) Då grödan har 2-3 blad på hösten															
3) Tidig vår vid tillväxtens början															
4) Våren vid tillväxtens början															
-X-	4470									90					
CV%	8									18.5					
OBS	67									68					
PROB F1	.0001									.3844					
LSD F1	510									24					

ANM:

H beh med: 60 g Lexus Class 2) + 200 g Hussar + 0.1 l Lissapol Bio 3). K beh vid tidp 4). N block II kasserat.

Missfärgningar: Gulfärgning. Datum för gradering av tillväxthämningar: Led D 2002-04-22, K och P 2002-05-15.

Vattenskada: I block III. Ogräsförekomst: >10: Förekomst av ven. Osäkerhet hos skörden i led E p.g.a. missat spannmålsprov (Renviktsfaktorn uträknad som medeltal av renviktsfaktorerna för led B-D samt F-Q).



R E S U L T A T B L A N K E T T, SKÖRD 2002

SIDA 2

Östra SverigeFörsöken

ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404

PLAN: L5- 240-2002 Åkerven och örtogräs i höstvete, höst och vår

ADB-NR: 05A487

LÅN-FNR: E-112-2001

JBR.OMR: 12b

GRÖDA: Höstvete

FÖRSÖKSVÄRD: Göran Roos

ADRESS: Tuna Kungsgård, Rystad, Linköping

GÖDSLING

DATUM

MÄNGD KG/HA

N P K

NPK 20-4-8

2002-04-01

225

45 10 19

Kalksalpeter

2002-05-02

600

93

SORT: Kosack

SÅTT DEN: 2001-09-26 KG/HA: 200

FÖRFRUKT: Ärter

JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG LERIG SAND

VÄXTSKYDD

DATUM

Y.M15:F1 *** A<>B A<>C A<>D A<>E A<>F A<>G A<>H A<>I A<>J A<>K A<>L A<>M A<>N A<>O
Y.M15:F1 *** A<>Q C<>P D<>P F<>P H<>P I<>P J<>P K<>P L<>P N<>P O<>P
Y.M15:F1 ** B<>P E<>P G<>P M<>P P<>Q
Y.M15:F1 * B<>H B<>L E<>H E<>L H<>M L<>M
STS.SH:F1 * E<>H E<>M

Sprutjournal

ADB-nr:	05A487
Plan-nr:	L5- 240-2002
Försöksnr:	E-112-2001
Närmaste väderstr:	Malmslätt

	Spruttillfälle					
	1	2	3	4	5	6
Behandlade försöksled:	B-G	I, J	H, L, M	E-G, K, N-Q		
Typ av spruta:	Västerås	Västerås	Västerås	Västerås		
Spridare, typ:	Hardi blå ISO	Hardi blå ISO	Hardi blå ISO	Hardi blå ISO		
Arbetsstryck, MPa:	0.20	0.20	0.20	0.20		
Datum:	2001-10-17	2001-10-22	2002-04-22	2002-05-06		
Tid på dagen:	11.20-12.00	08.30-09.10	11.00-11.20	13.00-15.15		
Grödans utveckling (decimalskalan):	11.5	12	23	31		
Grödans täthet (gles, normal, tät):	normal	normal	normal	normal		
Ogräsens utveckling:	11	11-12	Ven 24, örtog 12-22	25-30		
Ogräsbestånd (glest, normalt, tätt):	normalt	tätt	tätt	tätt		
Tillväxthastighet (låg, normal, hög):	hög	normal-hög	normal	hög		
Temperatur, °C (30 cm ovan mark):	11.3	5.8	16.8	15.3		
Rel. fuktighet, % (30 cm ovan mark):	87.3	84.2	45.8	51.7		
Markfuktighet (våt, normal, torr):	normal-våt	normal-våt	normal-fuktig	våt		
Molnighet, %:	100	30	0 (soldis)	30		
Vindhastighet i ögonhöjd, m/s:	1.9	2.4	3.1	0.5		
Vindriktning över rutorna (längs, tvärs, diagonalt):	diagonalt	längs	längs	diagonalt		
Dagg (mycket, måttlig, ingen):	ingen	måttlig	ingen	måttlig		
Förekomst av frost eller torka:	nej	nej	nej	nej		
Regnfri tid efter behandling:	> 20 tim	> 20 tim				
Övrigt:	Vindskydd monterat	Vindskydd monterat	Vindskydd monterat	Vindskydd monterat		