



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2002
Östra SverigeFörsöken
PLAN: L5- 306-2002 Örtogräs i höstvetete, höst och vår
ADB-NR: 05A494 LÅN-FNR: T-062-2001 JBR.OMR: 13c
FÖRSÖKSVÄRD: Leif Karlsson
ADRESS: Hjälmarsberg, Örebro

SIDA 1
ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404
GRÖDA: Höstvetete

GÖDSLING

DATUM

MÄNGD KG/HA

N P K

SORT:
SÅTT DEN: KG/HA:
FÖRFRUKT:
JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG STYV LERA
PH-VÄRDE:
VÄXTSKYDD
DATUM



Bearbetat av FFE, SLU

R E S U L T A T:

F Ö R S Ö K S L E D:


A. Obehandlat
B. 1.2 l Duplosan Meko 1)
C. 0.75 l Cougar 2)
D. 0.75 l Bacara 2)
E. 2.0 tabl (10 g) Express + 40 g Plattform 2)
F. 1.0 tabl (5.0g) Express+0.11 Lissap.Bio 2) +1.5 tabl (7.5g) Express+40g Plattform 5)
G. 0.3 l Cougar 2) + [Behovsanpassning av preparat och dos på våren]
H. 1.0 l Duplosan Meko + 0.15 l Lotus 3)
I. 2.0 l Duplosan Super + 0.25 l Lotus 4)
J. 70 g Tooler + 0.1 l DP Vätmedel 4)
K. 125 g Tarok + 1.0 l Citowett 2000 4)
L. 0.1 l Primus + 0.2 l Lissapol Bio 5)
M. 50 g Ally Class 4)
N. 25 g Ally Class 4)
O. 2.0 tabl (10 g) Express + 40 g Plattform 4)
P. 35 g Ally Class + 0.35 l Starane 180 5)
Q. 1.5 tabl (7.5 g) Express + 0.1 l Primus + 0.2 l Lissapol Bio 5)
R. 1.5 tabl (7.5 g) Express + 0.5 l Starane 180 + 0.1 l Lissapol Bio 5)
S. 0.5 l Cougar + 15 g Gratil + 0.1 l Lissapol Bio 5)
T. 0.1 l Primus + 40 g Plattform 5)

- 1) Då grödan har 1.5-2 blad på hösten
- 2) Då grödan har 2-3 blad på hösten
- 3) Då grödan har 2-3 blad på hösten, ogräs inkl snärjmåra skall ha kommit upp
- 4) Mkt tidig vår, 10-14 dygn före normal Expressbeh
- 5) Vid tillväxtens början på våren

Snärj- måra	Rel	Snärj- måra	Rel	Viol	Rel	Viol	Rel	Vätarv	Rel			
st/m2	tal	g/m2	tal	st/m2	tal	g/m2	tal	g/m2	tal			
06-11		06-11		06-11		06-11		06-11				
23.8	100	230.8	100	5.0	100	14.3	100	104.3	100			
9.3	39	84.8	37	3.0	60	6.8	47	0.0	0			
3.0	13	8.5	4	0.3	5	0.3	2	0.0	0			
1.0	4	1.8	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0			
10.0	42	78.5	34	1.5	30	4.0	28	0.0	0			
18.0	76	146.8	64	3.0	60	13.5	95	0.0	0			
16.5	69	137.5	60	0.0	0	0.0	0	0.0	0			
1.5	6	3.3	1	0.3	5	0.5	4	0.0	0			
0.0	0	0.0	0	0.3	5	0.3	2	5.0	5			
0.0	0	0.0	0	0.3	5	0.5	4	0.0	0			
0.0	0	0.0	0	0.3	5	0.3	2	0.0	0			
2.8	12	4.0	2	0.8	15	0.8	5	0.0	0			
0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0			
0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0			
0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0			
0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0			
0.0	0	0.0	0	0.5	10	0.5	4	0.3	0			
0.3	1	0.3	0	0.3	5	0.3	2	0.3	0			
0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0			
0.0	0	0.0	0	0.8	15	1.0	7	0.0	0			

ANM:

Led M-O beh vid tidp 5).
INGEN SKÖRD.



Sprutjournal

ADB-nr:	05A494
Plan-nr:	L5- 306-2002
Försöksnr:	T-062-2001
Närmaste väderstr:	

	Spruttillfälle					
	1	2	3	4	5	6
Behandlade försöksled:	B	C-H		I-K	F, L-T	
Typ av spruta:	Sprumo	Sprumo		Sprumo	Sprumo	
Spridare, typ:						
Arbetsstryck, MPa:	0.2	0.2		0.2	0.2	
Datum:	2001-10-05	2001-10-15		2002-04-05	2002-05-02	
Tid på dagen:	13.00	10.00		10.30-12.30	16.00	
Grödans utveckling (decimalskalan):	1 blad	3 blad		23	31	
Grödans täthet (gles, normal, tät):	normal	normal		normal	tät	
Ogräsens utveckling:	1 cm	2 cm		2 cm	Snärjmåra 5 kransar, övriga 5-10 cm	
Ogräsbestånd (glest, normalt, tätt):	normalt	normalt		normalt	normalt	
Tillväxthastighet (låg, normal, hög):	normal	normal		normal	hög	
Temperatur, °C (30 cm ovan mark):	17	14		5	15	
Rel. fuktighet, % (30 cm ovan mark):	65	65		70	66	
Markfuktighet (våt, normal, torr):	normal	våt		normal	våt	
Molnighet, %:	10	90		sol	20	
Vindhastighet i ögonhöjd, m/s:	3	1		2	0.5-1	
Vindriktning över rutorna (längs, tvärs, diagonalt):	längs	längs		längs	längs	
Dagg (mycket, måttlig, ingen):	ingen	måttlig		ingen	måttlig	
Förekomst av frost eller torka:				frost natten före	nej	
Regnfri tid efter behandling:	> 20 tim	> 20 tim		> 20 tim	18 tim	
Övrigt:						