



RESULTATBLANKETT, OGRÄS 2002
Fältforskningsenheten, ogräsreglering
PLAN: R5-2100-2002 Kvickrot och örtogräs i höstvetete, vår, GEP
ADB-NR: 05A495 LÅN-FNR: L-406-2002 JBR.OMR: 2
FÖRSÖKSVÄRD: Bengt Ekelund
ADRESS: Ingelstorp, Åstorp

SIDA 1
ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404
GRÖDA: Höstvetete

SORT: Tarso
SÅTT DEN: 2001-10-01 KG/HA: 190
FÖRFRUKT: Sockerbetor
JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG LERIG MO
PH-VÄRDE:

GÖDSLING	DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
N 34	2002-03-15	210	72		
Axan	2002-04-26	220	59		
Kalksalpeter	2002-06-09	200	31		

VÄXTSKYDD	DATUM
0.7 l Cougar + 1.0 l Arelon	2001-10-20
0.5 l Amistar	2002-06-08
0.3 l Sumi-alpha	2002-06-08

RESULTAT:

FÖRSÖKSLED:	Pilört		Pilört		Åker-binda		Åker-binda		Övriga ettåriga örtog		Övriga ettåriga örtog		Samtliga ettåriga örtog		Samtliga ettåriga örtog			
	st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal	st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal	st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal	st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal		
A. Obehandlat	9.0	100	48.8	100	13.0	100	38.0	100	0.8	100	1.3	100	22.8	100	88.0	100		
B. 18.75 - 25 g Monitor + 0.1 l Lissapol Bio 1) (M)	0.3	3	0.3	1	4.0	31	1.8	5	1.5	200	4.3	340	5.8	25	6.3	7		
C. 175 g Atlantis + 0.1 l Lissapol Bio 2)	0.0	0	0.0	0	4.0	31	1.8	5	0.8	100	1.8	140	4.8	21	3.5	4		
D. 350 g Atlantis + 0.1 l Lissapol Bio 2)	4.8	53	22.5	46	7.5	58	2.0	5	0.8	100	0.8	60	13.0	57	25.3	29		
E. 700 g Atlantis + 0.1 l Lissapol Bio 2)	0.3	3	0.3	1	4.0	31	1.0	3	3.3	433	8.8	700	7.5	33	10.0	11		
F. 1400 g Atlantis + 0.1 l Lissapol Bio 2)	1.5	17	5.8	12	2.3	17	1.0	3	1.5	200	2.0	160	5.3	23	8.8	10		
1) Då kvickroten har 2-4 blad och grödan DC 21-32.																		
2) Tidigt på våren när tillväxten börjat, nattfrost ej förväntas och kvickroten är i 2-4 bladsstadiet.																		

ANM:
Dos av Monitor i led B: 25 g/ha.
OBS! Hela försöket beh mot gräs- och örtogräs med 0.7 l/ha Cougar + 1.0 l/ha Arelon 2001-10-20.



RESULTATBLANKETT, OGRÄS 2002
Fältforskningsenheten, ogräsreglering
PLAN: R5-2100-2002 Kvickrot och örtogräs i höstvete, vår, GEP
ADB-NR: 05A495 LÅN-FNR: L-406-2002 JBR.OMR: 2
FÖRSÖKSVÄRD: Bengt Ekelund
ADRESS: Ingelstorp, Åstorp

SIDA 2
ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404
GRÖDA: Höstvete

SORT: Tarso
SÅTT DEN: 2001-10-01 KG/HA: 190
FÖRFRUKT: Sockerbetor
JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG LERIG MO
PH-VÄRDE:

GÖDSLING	DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
N 34	2002-03-15	210	72		
Axan	2002-04-26	220	59		
Kalksalpeter	2002-06-09	200	31		

VÄXTSKYDD	DATUM
0.7 l Cougar + 1.0 l Arelon	2001-10-20
0.5 l Amistar	2002-06-08
0.3 l Sumi-alpha	2002-06-08

RESULTAT:

FÖRSÖKSLED:	Kvick- * rot		Kvick- * rot														
	st/m2 07-10	Rel tal	g/m2 07-10	Rel tal													
A. Obehandlat	66.3	100	201.8	100													
B. 18.75 - 25 g Monitor + 0.1 l Lissapol Bio 1) (M)	32.8	49	34.3	17													
C. 175 g Atlantis + 0.1 l Lissapol Bio 2)	39.5	60	103.0	51													
D. 350 g Atlantis + 0.1 l Lissapol Bio 2)	28.5	43	47.0	23													
E. 700 g Atlantis + 0.1 l Lissapol Bio 2)	31.8	48	32.8	16													
F. 1400 g Atlantis + 0.1 l Lissapol Bio 2)	18.5	28	21.0	10													
1) Då kvickroten har 2-4 blad och grödan DC 21-32.																	
2) Tidigt på våren när tillväxten börjat, nattfrost ej förväntas och kvickroten är i 2-4 bladsstadiet.																	

ANM:
Dos av Monitor i led B: 25 g/ha.
OBS! Hela försöket beh mot gräs- och örtogräs med 0.7 l/ha Cougar + 1.0 l/ha Arelon 2001-10-20.



RESULTATBLANKETT, SKÖRD 2002
Fältforskningsenheten, ogräsreglering
PLAN: R5-2100-2002 Kvickrot och örtogräs i höstvetete, vår, GEP
ADB-NR: 05A495 LÅN-FNR: L-406-2002 JBR.OMR: 2
FÖRSÖKSVÄRD: Bengt Ekelund
ADRESS: Ingelstorp, Åstorp

SIDA 1
ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404
GRÖDA: Höstvetete

SORT: Tarso
SÅTT DEN: 2001-10-01 KG/HA: 190
FÖRFRUKT: Sockerbetor
JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG LERIG MO
PH-VÄRDE:

GÖDSLING	DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
N 34	2002-03-15	210	72		
Axan	2002-04-26	220	59		
Kalksalpeter	2002-06-09	200	31		

VÄXTSKYDD	DATUM
0.7 l Cougar + 1.0 l Arelon	2001-10-20
0.5 l Amistar	2002-06-08
0.3 l Sumi-alpha	2002-06-08

RESULTAT:

FÖRSÖKSLED:	Skörd renv kg/ha 08-09	Rel tal	Av rens pro cent	Vat ten halt skörd	Liter vikt g	Miss färgn vår 0-100 05-07	Blad de form vår 05-07	Miss färgn vår 0-100 05-15	Blad de form vår 05-15	Strå st vid skörd 08-09	Kondi tion och vigör 08-09	Kvick rot grad rel A 08-09					
A. Obehandlat	6450	100	2.9	18.1	805	0	0	0	0	97	100	20	100				
B. 18.75 - 25 g Monitor + 0.1 l Lissapol Bio 1) (M)	6820	106	1.0	16.6	806			0	1	94	98	2	9				
C. 175 g Atlantis + 0.1 l Lissapol Bio 2)	6350	98	1.6	17.1	794	1	1	0	0	95	98	7	34				
D. 350 g Atlantis + 0.1 l Lissapol Bio 2)	7040	109	0.8	16.6	818	2	0	1	0	97	100	3	14				
E. 700 g Atlantis + 0.1 l Lissapol Bio 2)	6120	95	0.9	16.7	798	4	2	1	1	95	98	2	11				
F. 1400 g Atlantis + 0.1 l Lissapol Bio 2)	6820	106	0.8	16.5	806	8	4	1	2	91	98	2	10				
1) Då kvickroten har 2-4 blad och grödan DC 21-32. 2) Tidigt på våren när tillväxten börjat, nattfrost ej förväntas och kvickroten är i 2-4 bladsstadiet.																	
-X- CV% OBS PROB F1 LSD F1	6600 5.7 24 .0278 560									95 3.3 24 .2289 5							

ANM:

Dos av Monitor i led B: 25 g/ha.
Riklig förekomst av pilört i led A block IV samt B och C block III vid skörd 08-09.
Sprutspår genomgående i samtliga rutor i block I+III vid skörd 08-09.
OBS! Hela försöket beh mot gräs- och örtogräs med 0.7 l/ha Cougar + 1.0 l/ha Arelon 2001-10-20.



R E S U L T A T B L A N K E T T, SKÖRD 2002

SIDA 2

Fältforskningsenheten, ogräsreglering

ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404

PLAN: R5-2100-2002 Kvikrot och örtogräs i höstvete, vår, GEP

ADB-NR: 05A495 LÅN-FNR: L-406-2002 JBR.OMR: 2

GRÖDA: Höstvete

FÖRSÖKSVÄRD: Bengt Ekelund

ADRESS: Ingelstorp, Åstorp

SORT: Tarso

SÅTT DEN: 2001-10-01 KG/HA: 190

FÖRFRUKT: Sockerbetor

JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG LERIG MO

GÖDSLING

N 34

Axan

Kalksalpeter

DATUM

2002-03-15

2002-04-26

2002-06-09

MÄNGD KG/HA

210

220

200

N P K

72

59

31

VÄXTSKYDD

DATUM

Y.M15:F1 **

D<>E

Y.M15:F1 *

A<>D B<>E C<>D E<>F

STS.SH:F1 *

A<>F D<>F

Sprutjournal

ADB-nr:	05A495
Plan-nr:	R5-2100-2002
Försöksnr:	L-406-2002
Närmaste väderstn:	

	Spruttillfälle					
	1	2	3	4	5	6
Behandlade försöksled:	C-F	B				
Typ av spruta:	Agro-Top I	Agro-Top II				
Spridare, typ:	Teejet DS 110 015 VS					
Arbetsstryck, MPa:						
Datum:	2002-04-25	2002-05-07				
Tid på dagen:	13.00-14.00	12.00-12.15				
Grödans utveckling (decimalskalan):	21-24	30-31				
Grödans täthet (gles, normal, tät):	normal-gles	normal-gles				
Ogräsens utveckling:	Kvickrot 2-4 blad	4 blad				
Ogräsbestånd (glest, normalt, tätt):	normalt	normalt				
Tillväxthastighet (låg, normal, hög):	normal	normal				
Temperatur, °C (30 cm ovan mark):	14	18				
Rel. fuktighet, % (30 cm ovan mark):	57	45				
Markfuktighet (våt, normal, torr):	torr	normal				
Molnighet, %:	60	20				
Vindhastighet i ögonhöjd, m/s:	2-3	2-3				
Vindriktning över rutorna (längs, tvärs, diagonalt):	tvärs (S)	längs (O)				
Dagg (mycket, måttlig, ingen):	ingen	ingen				
Förekomst av frost eller torka:	nej	nej				
Regnfri tid efter behandling:	3 dygn	7 dygn				
Övrigt:						