R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2002 SIDA 1

Fältforskningsenheten, ogräsreglering ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404

PLAN: R5-2100-2002 Kvickrot och örtogräs i höstvete, vår, GEP

ADB-NR: 05A496 LÄN-FNR: M-910-2002 JBR.OMR: 1a GRÖDA: Höstvete

FÖRSÖKSVÄRD: Håkan Jönsson

ADRESS: Klörup, Trelleborg

GÖDSLING	DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
N 26 S	2002-03-24	300	78		
N 34	2002-04-12	230	79		

SORT: Ritmo

SÅTT DEN: 2001-10-07 KG/HA: 230

FÖRFRUKT: Höstvete

JORDART: NÅGOT MULLHALTIG STYV LERA

VÄXTSKYDD DATUM

PH-VÄRDE:

R E S U L T A T:

F Ö R S Ö K S L E D:	Balders-brå st/m2 06-18	Rel tal	Balders-brå g/m2 06-18	Rel tal	Övriga ettåriga örtog st/m2 06-18	Rel tal	Övriga ettåriga örtog g/m2 06-18	Rel tal	Samtliga ettåriga örtog st/m2 06-18	Rel tal	Samtliga ettåriga örtog g/m2 06-18	Rel tal	Kvick-rot * st/m2 06-18	Rel tal	Kvick-rot * g/m2 06-18	Rel tal
A. Obehandlat	4.0	100	149.5	100	6.5	100	11.0	100	10.5	100	160.5	100	99.5	100	178.0	100
B. 18.75 - 25 g Monitor + 0.1 l Lissapol Bio 1) (M)	0.5	13	5.5	4	24.0	369	55.0	500	24.5	233	60.5	38	240.0	241	207.5	117
C. 175 g Atlantis + 0.1 l Lissapol Bio 2)	3.0	75	37.0	25	6.5	100	7.0	64	9.5	90	44.0	27	350.5	352	478.0	269
D. 350 g Atlantis + 0.1 l Lissapol Bio 2)	0.5	13	39.5	26	8.5	131	11.0	100	9.0	86	50.5	31	166.0	167	230.5	129
E. 700 g Atlantis + 0.1 l Lissapol Bio 2)	0.0	0	0.0	0	0.5	8	0.5	5	0.5	5	0.5	0	283.5	285	434.0	244
F. 1400 g Atlantis + 0.1 l Lissapol Bio 2)	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	131.5	132	119.5	67

1) Då kvickroten har 2-4 blad och grödan DC 21-32.

2) Tidigt på våren när tillväxten börjat, nattfrost ej förväntas och kvickroten är i 2-4 bladsstadiet.

ANM:

Dos av Monitor i led B: 25 g/ha.

OBS! Baldersbrå får EJ ingå i seriesammanställning p. g. a. få plantor i led A.

R E S U L T A T B L A N K E T T, SKÖRD 2002 SIDA 1

Fältforskningsenheten, ogräsreglering ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404

PLAN: R5-2100-2002 Kvickrot och örtogräs i höstvete, vår, GEP

ADB-NR: 05A496 LÄN-FNR: M-910-2002 JBR.OMR: 1a GRÖDA: Höstvete

FÖRSÖKSVÄRD: Håkan Jönsson

ADRESS: Klörup, Trelleborg

GÖDSLING	DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
N 26 S	2002-03-24	300	78		
N 34	2002-04-12	230	79		

SORT: Ritmo

SÅTT DEN: 2001-10-07 KG/HA: 230

FÖRFRUKT: Höstvete

JORDART: NÅGOT MULLHALTIG STYV LERA VÄXTSKYDD DATUM

PH-VÄRDE:

R E S U L T A T:

F Ö R S Ö K S L E D:	Skörd renv kg/ha 08-14	Rel tal	Av rens pro cent	Vat ten halt skörd	Liter vikt g	Beh. skada vår 0-100	Strå st vid skörd 08-14	Kvick rot grad 08-14	Kvick rot grad rel A 08-14	Ört ogräs grad 08-14
A. Obehandlat	2540	100	1.6	16.8	701	0	100	21	100	12
B. 18.75 - 25 g Monitor + 0.1 l Lissapol Bio 1) (M)	2560	101	2.1	16.5	684	0	100	18	84	5
C. 175 g Atlantis + 0.1 l Lissapol Bio 2)	2510	99	1.7	16.5	682	0	100	34	159	5
D. 350 g Atlantis + 0.1 l Lissapol Bio 2)	2730	107	1.2	16.6	705	0	100	24	112	7
E. 700 g Atlantis + 0.1 l Lissapol Bio 2)	2620	103	2.4	16.6	691	0	100	29	135	2
F. 1400 g Atlantis + 0.1 l Lissapol Bio 2)	2820	111	1.7	16.3	684	0	100	8	35	2
-X-	2630									
CV%	13.8									
OBS	24									
PROB F1	.8140									
LSD F1	540									

1) Då kvickroten har 2-4 blad och grödan DC 21-32.
2) Tidigt på våren när tillväxten börjat, nattfrost ej förväntas och kvickroten är i 2-4 bladsstadiet.

ANM:

Dos av Monitor i led B: 25 g/ha.

Sprutjournal

ADB-nr:	05A496
Plan-nr:	R5-2100-2002
Försöksnr:	M-910-2002
Närmaste väderstn:	Sturup

	Spruttillfälle					
	1	2	3	4	5	6
Behandlade försöksled:	B-F					
Typ av spruta:	Agro-Top					
Spridare, typ:	Spalt					
Arbetstryck, MPa:	0.2					
Datum:	2002-04-25					
Tid på dagen:	10.00					
Grödans utveckling (decimalskalan):	27					
Grödans täthet (gles, normal, tät):	gles					
Ogräsens utveckling:	Örtblad					
Ogräsbestånd (glest, normalt, tätt):	normalt					
Tillväxthastighet (låg, normal, hög):	normal					
Temperatur, °C (30 cm ovan mark):	12.7					
Rel. fuktighet, % (30 cm ovan mark):	78					
Markfuktighet (våt, normal, torr):	normal					
Molnighet, %:	90					
Vindhastighet i ögonhöjd, m/s:	1.5					
Vindriktning över rutorna (längs, tvärs, diagonalt):	diagonalt					
Dagg (mycket, måttlig, ingen):	ingen					
Förekomst av frost eller torka:	nej					
Regnfri tid efter behandling:	> 20 tim					
Övrigt:						